

Plochy ovocných sadů stále klesají

V České republice patří ovocnářství neodmyslitelně ke koloritu venkovské krajiny a ovocné sady se nacházejí jak v teplých oblastech jižní Moravy, tak v podhůří hor. Naši předkové dokázali velmi dobře využívat každou volnou mez a osázet ji ovocnými stromy. V ovocnářských oblastech byly postupem času osázeny i větší plochy, a to ne vždy na příznivých místech. V posledních letech však dochází ke klucení i těch sadů, které se vysazovaly hromadně v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století a ještě dnes představují významný podíl ploch přestářých produkčních sadů.

Evidence ploch sadů

Vývoj produkčních ploch ovocných sadů v České republice má stále klesající tendenci. Krátkodobě narysují ploch ekologických sadů v letech 2010–2013 nemělo výrazný vliv na produkční potenciál sektoru ovoce. Zatímco na začátku starého programovacího období v roce 2007 bylo v České republice evidováno 17 856 ha ovocných sadů, na konci období v roce 2013 stouply plochy krátkodobě na 22 687 ha ovocných sadů. Výrazně se však zvýšila jen plocha ekologických sadů z 619 hektarů v roce 2007 na 3877 hektarů v roce 2013.

Věková struktura sadů

Ani věkové struktura sadů tyto změny nepropověděly, protože skončily převážně mladé, špatně založené porosty, které často nevstoupily ani do plné plodnosti. V roce 2007 byl podíl přestářých sadů na úrovni 48 procent a v roce 2013 klesl na 47 procent. V posledních dvou letech se zvýšil podíl klucení i přestářých sadů a jejich podíl na celkové výměře klesl na 43 procent. Tento trend nastartovala v roce 2015 účinnost nařízení vlády č. 50/2015 Sb., které podporuje výsadbu ovocných druhů maxi-

malního stáří výsadby roku 1995. Prostá obnova sadů není dostatečně realizována ani s významnou účástí státu, kdy v rámci dotačního titulu 1.R na restrukturalizaci a obnovu sadů bylo za posledních 20 let tak vysazeno 12 518 ha.

Plochy podle ovocných druhů

V posledních pěti letech jsou produkční plochy ovocných sadů evidovaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským: 15 901 ha v roce 2011, 17 895 ha v roce 2012, 17 784 ha v roce 2013, 17 558 ha v roce 2014, 15 646 ha v roce 2015 a pokles v roce 2016 se zastavil na 14 451 ha. I z těchto čísel je patrný přechod programovacích období a nástup nové legislativy. Největší pokles ploch od roku 2013 byl u bílého rybízu o 75 %, dále u malinů a ostružiníku o 73 %, u broskvoní o 40 %, u višňového ořešáku o 39 %, u červeného rybízu o 33 %, u meruňky o 32 %, u jabloní o 21 %, u višní o 16 %. Ostatní druhy ne-

Plochy ovocných druhů v sadech České republiky v letech 2011–2016 (ha)

Ovocný druh	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angrešt	4,13	3,40	3,40	1,90	1,88	2,11
Broskvoň	722,60	652,04	583,97	564,09	406,98	348,60
Hrušeň	675,08	752,68	767,45	790,46	745,20	709,82
Jablňoň	7 943,70	9 071,38	9 079,80	9 023,14	7 974,86	7 178,46
Maliník a ostružiník	84,46	142,51	139,18	88,13	33,03	38,13
Meruňka	1 176,65	1 104,78	1 075,43	1 061,17	924,65	823,87
Ořešák vlašský	131,65	142,08	145,39	140,42	119,02	89,33
Rybíz bílý	7,60	7,60	7,50	7,60	3,95	1,90
Rybíz černý	272,20	346,66	348,57	315,26	357,73	331,97
Rybíz červený	741,95	853,15	879,38	789,71	638,41	586,08
Slivoň	1 584,07	2 041,28	2 071,58	2 126,15	2 056,34	1 995,79
Třešeň	887,01	951,69	956,64	954,23	900,52	888,62
Víšeň	1 602,92	1 753,37	1 647,19	1 557,32	1 425,20	1 381,89
Ostatní ovocné druhy	67,29	72,36	78,66	78,56	58,31	74,44
Celkem	15 901,31	17 894,98	17 784,14	17 558,14	15 646,08	14 451,01

Zdroj: Úřad Brno
osazení ovocné druhy, mandloň, jablňoň, jeřáb černý, bez černý, kaštanovník, jeřáb, borůvka

Doporučují více ...

(Dokonce ze str. 28)
Praskavec ledenový (*Psoralea caryopata* DC) je statná ovijivá bylina původem z ostrova Nová Guinea. Jedná se o typickou tropickou rostlinu, jejíž všechny části lze konzumovat. Listy je možné využít jako špe-


nát, květy jako salát, nezralé lusky jako zeleninu, zralá semena jako luskovinou a hlízu jako brambory. V podminkách České republiky praskavec jen velmi málo kvete a skoro nepodléhá. Vigna čínská (*Vigna unguiculata* (L.) Walp./ pravděpodobně

pochází z Afriky nebo jihovýchodní Asie. Tato tropická ovijivá bylina je podobná fazolu. Konzumní se zralá semena a nezralé lusky. V našich podmínkách vlna čínská kvete a vydávané plodí. Vigna podzemní (*Vigna subterranea* (L.) Verdc./ je původem ze západní Afriky. Podobně jako u podzemnice olejné se lusky této rostliny vyvíjejí pod zemí. Mohutná ovijivá rostlina lablab purpurový (*Lablab purpureus* (L.)/ pochází z tropické Afriky. Konzumní se nezralé lusky a semena. Lze pěstovat i u nás. V podminkách ČR kvete, ale lusky často nestihnou dozrát. Všechna rostlina, pěstovaná v tropech i jako jednoletá, kajan indický (*Cajanus cajan* (L.) Millsp./ je zřejmě původem z oblasti Indie. V našich podmínkách pěstovat nelze. Kajan vytváří keře velikosti černého bezu, jejichž semena se využívají podobně jako fazole.

Ing. Hana Honsová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze



Namnožením se část antitručních látek ze semen luskovin odstraňuje
Foto: Hana Honsová



Vývoj ploch ovocných druhů v sadech České republiky

klesly o více než deset procent. V zastoupení druhů jsou na prvním místě v roce 2016 jabloně se 7180 ha, na druhém místě slivoně s 1996 ha a třetí příčku drží višně s celkovou plochou 1382 ha. Čtvrté místo si drží třešně s 890 hektary a páté místo meruňky s 824 hektary.

Zastoupení odrůd

Také zastoupení jednotlivých odrůd u některých druhů se výrazně změnilo. Například u jabloní byl v roce 2013 nejvíce zastoupen Golden Delicious na ploše 1965 ha, těsně za ním Idared na ploše 1687 ha, dále odrůda Jonagold a její mutace na ploše 675 ha. Bramborovou příčku ještě obhájil Rubin se svými mutacemi a s plochou 632 ha. Plochu mírně nad 500 ha měly odrůdy Šampion a Spartan. Na konci roku 2016 klesly plochy odrůdy Golden Delicious na 1522 ha a odrůdy Idared na 1231 ha. Jonagold se se svými červenými mutacemi drží stále na třetím místě s 660 ha a také Rubin a jeho červené mutace drží čtvrtou pozici s plochou 559 ha. Na pátou pozici se dostala v posledních letech hojně sázená odrůda Gala a její mutace s 425 ha, předběhla tak dříve hojně sázený Šampion. Spartan se pomalu z českých sadů vytváří a jeho podíl se zastavil na 381 ha.

U slivoní byla v roce 2013 nejvíce zastoupena americká odrůda Stanley s plochou 358 ha, druhá odrůda Čačanska lepotica s 326 ha a o třetí místo se dělily odrůdy Domáci velkoploďa a Gabrovská s plochou 152 ha. Štorketarové plochy ještě zabíraly odrůdy Přeslédit a Čačanska naploja. Na kon-

ci roku 2016 stále vítězí odrůda Stanley s 386 ha, v těsném závěsu za ní je Čačanska lepotica s 363 ha a třetí místo drží Domáci velkoploďa s plochou 221 ha. Jako čtvrtá je zastoupena odrůda Gabrovská se 185 ha. V posledních letech často sázené německé odrůdy Topazie s 97 ha a Tophit s 92 ha obsadily páté a šesté místo.

Višně byly v roce 2013 nejvíce zastoupeny odrůdou Újfehértói Fürtös s plochou 434 ha. Druhé místo obsadila Morela pozdní s 371 ha a na třetím místě odrůda Fanal s 331 ha. Čtvrté místo obhájila odrůda Morellenfeuer s 256 ha a páté místo ěrti bötternö s 222 ha. Na konci roku 2016 stále drží první příčku odrůda Újfehértói Fürtös s 368 ha, ale na záda ji vytlačila odrůda Fanal s 351 ha. Morellenfeuer drží třetí místo s 313 ha a čtvrtá v pořadí je odrůda Morela pozdní s 283 ha. Madarská raná odrůda ěrti bötternö se 144 ha obsadila páté místo.

V pořadí ovocných druhů v sadech České republiky byly čtvrté místo v roce 2013 zastoupeny odrůdami: Kordia s 327 ha, Van se 134 ha, Napoleonova se 100 ha, Burtat s 97 ha a pátá pozdní chrupka Regina se 77 ha. Zatímco na konci roku 2016 bylo pořadí odrůd následující: na prvním místě stále Kordia s 369 ha, na druhém Napoleonova se 122 ha a těsně za ní odrůda Regidy čtvrté v pořadí Van s 93 ha a páté Burtat s 84 ha.

Páté v pořadí meruňky byly v roce 2013 zastoupeny odrůdami: první naše tradiční odrůda Velkopavlovická s plochou 527 ha, druhá francouzská odrůda Bergeron se 140 ha a třetí ame-

rický Goldrich s 67 ha. Čtvrtá se umístila Karola s 59 ha a pátá Madarská s 56 ha. Velkopavlovická drží první místo i na konci roku 2016 s plochou 465 ha, druhá je také odrůda Bergeron se 143 ha a stejně tak třetí Goldrich s 81 ha. Odrůdy Karola a Madarská si pouze prohodily čtvrté a páté místo, kdy Madarská je s plochou 58 ha a Karola s plochou 57 ha.

U hrušní, které v roce 2016 s plochou 710 ha drží šesté místo, se odrůdový sortiment příliš nemění. První místo stále drží odrůda Konference, jejíž plochy ve sledovaném období 2013 až 2016 mírně klesly z 211 ha na 205 ha. Druhé místo má odrůda Lucsova, u které došlo k nárůstu plochy ze 122 ha na 154 ha. Třetí v pořadí v roce 2013 Williamsova číslavka klesla ze 74 ha na 63 ha, a tím ji předbehla česká zimní odrůda Bohemica, která se pěstovala v roce 2016 na ploše 74 ha. Pátá v pořadí je odrůda Boskova lahvice s nárůstem plochy z 44 ha na současných 63 ha.

Rostoucí náklady na pořízení nových sadů, stále se opakující roznary počasi, absence kvalitních sezónních pracovníků a nízké realizaci ceny vyprodukovaného ovoce nedovolí zvrátit trend poklesu ploch ovocných sadů. Přitom by bylo třeba obnovit 43 procent přestářých sadů, což odpovídá ploše 6200 hektarů. Nejhorší věková struktura je u broskvoní a jabloní. Produkci nejen těchto druhů stále více nahrazuje dovezené ovoce.

Ing. Josef Vačkář
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno