

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled přípravků s rozšířením použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 4. až 30. 4. 2019. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (první část nových registrací naleznete v týdeníku Zemědělec 31/2019).

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Bofix (klopyralid 20 g/l, fluroxypyr 40 g/l, MCPA 200 g/l), Dow AgroSciences s. r. o., Praha, platnost do 31. 10. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Travníky	plevel dvouděložné jednoleté, plevel dvouděložné vytrvalé	4 l/ha, 250–400 l vody/ha	28	¹ od 14 BBCH ² postemergentně max. 1x za rok
Trávy	plevel dvouděložné jednoleté, plevel dvouděložné vytrvalé	4 l/ha, 250–400 l vody/ha	AT	¹ při výšce 15–20 cm ² postemergentně ³ semenné porosty max. 1x za rok

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Travníky, tráva – semenné porosty	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Travníky, tráva – semenné porosty	5	5	0	0

Nurelle (cypermethrin 40 g/l, chlorpyrifos-methyl 400 g/l), Arysta LifeScience Benelux SPRL, Belgie, platnost do 31. 10. 2019

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Brambor	mandelinka bramborová, mšice	0,75 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	21	¹ BBCH 09–95 max. 1x

Nurelle (cypermethrin 40 g/l, chlorpyrifos-methyl 400 g/l), Arysta LifeScience Benelux SPRL, Belgie, platnost do 31. 10. 2019 (dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Mák setý	mšice	0,75 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ do 59 BBCH max. 1x
Řepka olejka jarní, hořčice	krytonosec čtyřzubý, blýskáček řepkový	0,625 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ do 59 BBCH, před květem max. 1x
Pšenice, žito, tritikale	kyjatka travní	0,75 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	28	¹ do 51 BBCH max. 1x
Pšenice, žito, tritikale	kyjatka obilná	0,625 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	28	¹ BBCH 09–59 max. 1x
Pšenice, ječmen, oves	kohoutek černý	0,6 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	28	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Řepka olejka ozimá	krytonosec čtyřzubý, blýskáček řepkový	0,75 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–59, před květem max. 1x
Ječmen	kyjatka travní, kyjatka obilná	0,6 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	28	¹ BBCH 50–70 max. 1x
Řepka olejka ozimá	krytonosec řepkový	0,75 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–39 ² 7–10 dnů po zjištění výskytu max. 1x
Pšenice, ječmen, žito	mšice	0,6 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	60	¹ BBCH 50–70 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

(Pokračování na str. 33)

Odrůdy hrdé na svůj původ

Žijeme v zemi, kde byly položeny základy světové genetiky. Šlechtění zde má hlubokou historii a tradici, ve které již více než čtvrt století, coby ryze česká firma, úspěšně pokračuje Selgen. Na této jedinečnosti si velmi zakládáme. Naše portfolio plodin i odrůd je široké a k osvědčeným stálícím neustále přibývají další nadějně novinky.

Julie ... vítězka, co mění pravidla hry

Julie dominuje nejen v ČR jakožto nejpěstovanější „éčková“ odrůda, ale intenzivně prohlubuje své renomé světové odrůdy i v zahraničí. Jako pravidelná účastnice mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimých pšenic na DLG Felde tage v Německu tuto soutěž v loňském roce jednoznačně ovládla a zvítězila nejen v rámci technologií, ale i výnosu. Julie navíc vynikající výsledek podtrhla dosaženou vysokou kvalitou. Svoji širokou dimenzi si podmanila pěstitele hned v několika evropských zemích jako SRN, Polsko, Slovensko, Ukrajina nebo Bělorusko. Najdete ji také na Balkáně, v Pobaltí nebo ve Španělsku.

Julie opět hitem sezóny na Znojensku

Žně se na jihu rozjely do plných obrátek a již první letošní výsledky ze sklizně potvrzují, že klíčové vlastnosti, jako síla, vytrvalost a spolehlivost, Julii rozhodně nechybí a naplňuje tak ambice odrůdy s železnou disciplínou a vysokým pěstitelským komfortem.

Názory z praxe

Ing. Miroslav Krejčí, agronom, středisko Kyjovice, člen skupiny Agroservis 1. zemědělská a. s. Višňové: „Julie je vytrvalá, spolehlivá odrůda, která se nejvíce přiblížila mé definici dokonalosti.“ Stanislav Holcman, agronom, Statek Břežany, spol. s r. o.:

„Poctivé éčko se spolehlivým výnosem.“ Ing. František Zvěřina, agronom, ZD Dešov: „Letošních 8,95 tuny v potravinářské jakosti mluví za vše.“

V těsném sousedství Znojma, „města s přívlastkem“, sídlí Zemědělské družstvo Šatov. Od loňského roku jde o jedno z osmi testovacích míst, kde Selgen zakládá své odrůdové pokusy základního sortimentu a novoslechtění a zároveň o již tradičního pěstitele Julie. Požádala jsem Ing. Michala Peterku, hlavního agronoma a předsedu představenstva o její krátké pěstitelské hodnocení: „Hospodaříme na výměře 1250 hektarů orné půdy v kukuřičné výrobní oblasti přímo na hranici s Rakouskem, osm kilometrů jižně od Znojma. Skladba plodin je následující: ozimá pšenice, kukuřice na zrn, slunečnice, cukrovka, ozimý ječmen. Přetrvávající změna klimatu s dlouhotrvajícími epizodami sucha a především pak zvyšující se teploty nás donutila k pečlivému přístupu při výběru odrůd všech pěstovaných plodin. Výběr vhodné odrůdy je nepochybně během posledních let v našem suchém a teplém regionu velmi důležitým faktorem celého výrobního procesu. Proto jsme začali realizovat vlastní poloprovozní testovací pokusy vytvářených odrůd a to nejlepší poté použijeme do ostrého provozu. Mezi takto vyselektované a především pak suchými roky také prověřené odrůdy patří v oblasti pěstování ozimé pšenice jednoznačně Julie. Během po-



Ing. Ondřej Veškrna za šlechtitelské stanice Stupice přednáší o výhodách pěstování odrůdy Julie Foto Ilona Čigániková

sledních tří velmi suchých let dokázala splnit naše očekávání úměrná tvrdým ročníkovým podmínkám a vždy udržela vysokou potravinářskou kvalitu podpořenou také výnosem, který byl pokaždé asi o 0,5 t/ha vyšší než průměr podniku. Čísly letošní sklizně, podotýkám nemálo

ovlivněné hrabošem, to znamená, že Julie ze 110 ha dala průměrný výnos 5,25 t/ha (průměr podniku 4,80 t/ha) s vynikající potravinářskou kvalitou (průměr N-látek 16,6 % a OH 79,1 kg/hl). Julie patří dlouhodobě mezi naše nosné odrůdy a pro další sklizeň počítáme

s dalším navýšením její výměry. Na trhu je mnoho odrůd, ale málo takových, jaká je naše česká Julie. Julie je pro nás zkrátka jistota.“

Steffi – nová síla pěstitelské tvořivosti

Steffi kompatibilní

Steffi je ambiciózní pšenice, jejímž revírem jsou všechny oblasti i podmínky pěstování. Intenzivně odnožívá odrůda se střední mrazuvzdorností, vhodná k raným i pozdním výsevům, s vysokou odolností k fuzarióze v klasu, umožňující jí i výsevy po kukuřici. Vzhledem k tomu, že se umí vytáhnout, je nutné dohlédnout na jemné doladění poléhání.

Steffi multifunkční

Steffi je nabitá vlastnostmi v duchu dnešní doby a byla navržena tak, aby spolehlivě sedla na vaše pole. Běčková odrůda s vysokou objemovou hmotností, solidním obsahem N-látek a vynikajícím zdravotním stavem přináší do agronomického světa novou perspektivu.

Steffi inspirativní

Každý příběh chce svůj čas, ovšem český původ, houževnatost a intuitivní uživatelské rozhraní v loňském roce Steffi doslova vystřelilo do popředí zájmu českých a moravských agronomů a v tom letošním ve svém trendu intenzivně pokračuje.

Milan Šuba, agronom, Agrodružstvo Vrbovec, člen skupiny AGROSERVIS 1. zemědělská a. s.: „Steffi nelimituje, je přizpůsobivá, obětavá a vstřícná.“ Ing. Radovan Ryšavý, AGD Miro-

slav: „Zadané podmínky zvládla na jedničku.“ Ing. Milan Janda, Agrodružstvo Petrovice: „Výborně překonává nástrahy.“

Liseta

Vyladěná kombinace

Geny jsou podstatou jedinečnosti odrůdy určující její možnosti i limity. Rodová linie Lisety je v tomto směru ze skupiny VIP, neboť spojení praxí prověřených rodičů Elly a Seladonu dodává rodnému listu Lisety zlatý rámeček výnosu a stabilní jakosti. Intenzivně odnožívá „áčko“ se může opřít i o svůj zdravotní stav přinášející vysokou toleranci k fuzariózám v klasu, rzi plevové a travní. Bonusový balíček této novinky uzavírá možnost výsevu po kukuřici i obilnině a vynikající mrazuvzdornost.

FARMA U TRÍ DUBŮ s. r. o., okres Znojmo, agronom Jaromír Lorenc: „Při hledání vhodné odrůdy využíváme vlastní poloprovozní pokusy. V letošním roce české šlechtění opět neklamalo a Liseta k nejlepšímu výnosu přidal i avizovanou jakost.“

Naše země, naše hrdost

S pěstováním pšenice je to jako s jídlem: můžete ho buď otráveně přezývat, nebo labužnický vychutnávat. Pojem „zlaté české ručičky“ získává na intenzitě, stejně jako známé pořekadlo, že „domácí je vždycky lepší“. A už dávno to neplatí jen o svičkové od maminky...

Ilona Čigániková
Selgen, a. s.

(Pokračování ze str. 32)

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Brambor	50	20	10	4
Hořčice, mák setý, jarní pšenice, řepka olejka jarní, jarní tritikale, jarní žito, jarní oves, jarní ječmen	50	16	8	4
Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimé žito, ozimý oves, ozimý ječmen	50	15	8	4
Řepka olejka ozimá	30	14	7	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)				
Brambor, hořčice, mák setý, pšenice, tritikale, žito, oves, ječmen, řepka olejka	5	5	5	5

Valis M (mankozeb 600 g/kg, valifenalát 60 g/kg), Belchim Crop Protection NV/SA, Belgie, platnost do 31. 1. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Réva	plíseň réвовá	1 kg/ha do BBCH 61, 2 kg/ha od BBCH 61 200–800 l/ha (max. 400 l/ha do BBCH 61)	28	¹ BBCH 53–79 ² hrozny moštové max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 10 dnů
Réva	plíseň réвовá	1 kg/ha do BBCH 61, 2 kg/ha od BBCH 61 200–800 l/ha (max. 400 l/ha do BBCH 61)	70	¹ BBCH 53–69 ² hrozny stolní max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 10 dnů
Brambor	plíseň bramborová	2,5 kg/ha, 150–400 l vody/ha	7	¹ BBCH 21–89 max. 4x (do BBCH 40 max. 1x), interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k určení sklizně

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Brambor	4	4	4	4
Réva	6	6	6	6

Vibrance Gold (sedaxan 50 g/l, difenokonazol 25 g/l, fludioxonyl 25 g/l), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 10. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Pšenice	fuzariózy, kořenomorka obilní (choroby pat stébel), plíseň sněžná, sněť mazlavá pšeničná, sněť zakrslá, sněť prашná pšeničná	0,2 l/100 kg	AT	⁴ výsevek 200 kg/ha moření
Ječmen	sněť ječná tvrdá, pruhovitost ječná, paluška travní	0,2 l/100 kg	AT	⁴ výsevek 200 kg/ha moření
Žito	plíseň sněžná, sněť stébelná	0,2 l/100 kg	AT	⁴ výsevek 200 kg/ha moření
Tritikale	plíseň sněžná	0,2 l/100 kg	AT	⁴ výsevek 200 kg/ha moření
Oves	sněť ovesná	0,15 l/100 kg	AT	⁴ výsevek 200 kg/ha moření

Poznámka: ⁴k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

4. Rozšířené použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána.

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (= menšinová použití)

a) rozhodnutí vydána držiteli povolení k přípravku
Rozhodnutí nebyla vydána.

b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Domark 10 EC (tetrakonazol 100 g/l), platnost do 31. 12. 2019

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Ovocné školky, okrasné školky	padlí	0,25–0,4 l/ha, 300–1 000 l vody/ha	AT	max. 3x za rok

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

(Pokračování na str. 34)

inzerce

PŠENICE OZIMÁ

JULIE^E

- nejprodávanější elitní pšenice
- výnosová stabilita napříč všemi oblastmi
- vítěz výnosových zkoušek DLG 2018
- česká odrůda evropského formátu

selgen[®]

Přehled nových ...

(Dokončení ze str. 33)

Domark 10 EC (tetrakonazol 100 g/l), platnost do 31. 12. 2019 (dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Jírovec maďal	hnědá skvrnitost listů jírovce	10–60 ml/1 l vody, 100–1 000 ml vody/ /strom, podle velikosti stromu	–	"BBCH 20–99 min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu max. 1x za rok, injektáž

Poznámka: "k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

NeemAzal-T/S (azadirachtin 10,6 g/l), platnost do 31. 5. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Jilm	bělokaz jilmový	10–30 ml/1 l vody, 100–1 000 ml vody/ /strom, podle velikosti stromu	–	"BBCH 20–99 min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu max. 1x za rok, injektáž
Lípa	zdobnatka lipová	10–30 ml/1 l vody, 100–1 000 ml vody/ /strom, podle velikosti stromu	–	"BBCH 20–99 min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu max. 1x za rok, injektáž
Smrk	korovnice smrková	10–30 ml/1 l vody, 100–1 000 ml vody/ /strom, podle velikosti stromu	–	"BBCH 20–99 min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu max. 1x za rok, injektáž
Stromy listnaté opadavé	korovnice smrková	10–30 ml/1 l vody, 100–1 000 ml vody/ /strom, podle velikosti stromu	–	"BBCH 20–99 min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu max. 1x za rok, injektáž

Poznámka: "k plodině

inzerce

Topsin M 500 SC (thiofanát-methyl 500 g/l), platnost do 31. 10. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Ovocné školky, okrasné školky	krčkové a kořenové hniloby mimo oomycety	0,6–0,7 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	max. 1x za rok
Slunečnice	hlízenka obecná, plíseň šedá, fomová hniloba slunečnice, červenohnědá skvrnitost slunečnice	1,5–1,8 l/ha, 300–400 l vody/ha	AT	"BBCH 15–19 nebo BBCH 51–61 max. 1x
Jilm	grafióza jilmu	10–30 ml/1 l vody 100–1 000 ml vody/ /strom, podle velikosti stromu	–	"BBCH 20–99 min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu max. 1x za rok, injektáž

Poznámka: "k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ovocné a okrasné školky <50 cm	5	4	4	4
Ovocné a okrasné školky 50–150 cm	16	12	7	6
Ovocné a okrasné školky >150 cm	40	30	25	14

VitiSan (hydrogenuhlíčen draselný 994,9 g/kg), platnost do 31. 8. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta	Poznámka
Peckoviny	padlí, houbové choroby	1,5–10 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	0	max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Drobné ovoce	plíseň, padlí	5 kg/ha, 500–1 000 l vody/ha	1	"BBCH 03–93 max. 8x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů

Poznámka: "k plodině

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

Nařízení nebyla vydána.

Další informace lze nalézt na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová

PŠENICE OZIMÁ

STEFFI^B

- nejvýnosnější pšenice velmi raného sortimentu
- "chlebová" pšenice s elitní objemovou hmotností
- spolehlivá i za stresových podmínek
- intenzivně odnožující pšenice s dlouhým stéblem

selgen[®]