

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí první část přehledu nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití za období 1. 10. až 31. 10. 2019. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Eyetak (prochloraz 450 g/l), Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irsko, platnost do 31. 12. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice, tritikale	braničnatka pšeničná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–39 max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dní
Pšenice, tritikale	stéblolam	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–32 max. 1x, interval mezi aplikacemi 14 dní
Žito	hnědá skvrnitost ječmene	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–39 max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dní

Poznámka: ¹k plodině

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, tritikale, žito	9	4	4	4

Force Evo (tefluthrin 5 g/kg), DIACHEM S. P. A., Itálie, platnost do 31. 12. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	bázlivec kukuřičný	20 kg/ha	–	⁴ při předpokladu vyššího výskytu max. 1x, zapravení do půdy při seti
Kukuřice	bázlivec kukuřičný, drátovci	16 kg/ha	–	max. 1x, zapravení do půdy při seti
Brambor	drátovci	16 kg/ha	–	max. 1x, zapravení do půdy při výsadbě

Poznámka: ⁴k dávkování

Moddus ME (trinexapak-ethyl 250 g/l), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 30. 4. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–49 max. 1x v plodině
Ozimý ječmen	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–49 max. 1x v plodině
Ozimé tritikale, ozimé žito	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,6 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–39 max. 1x v plodině
Jarní ječmen	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,6 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–37 max. 1x v plodině
Ozimá řepka	zvýšení odolnosti proti poléhání	1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 39–55 max. 1x v plodině

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Molina (tetrakonazol 125 g/l), Isagro S. p. A., Itálie, platnost do 31. 12. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice	padlí travní, braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová	1 l/ha, 200–600 l vody/ha	–	¹ BBCH 40–69 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině

Nissorun 25 SC (hexythiazox 250 g/l), Nisso Chemical Europe GmbH, Německo, 31. 5. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Chmel	sviluška chmelová	0,6 l/ha, 800–3 300 l vody/ha	28	² podle signalizace ³ venkovní prostory max. 1x/rok ¹ BBCH 51–79
Jabloň, hrušeň	sviluška chmelová, sviluška ovocná	0,39 l/ha (0,13 l/1 m výšky koruny/ha) 500–1 500 l vody/ha	28	² při zjištění výskytu ³ venkovní prostory max. 1x/rok ¹ do BBCH 97
Jahodník	sviluška chmelová, sviluška ovocná	0,32 l/ha, 500–2 000 l vody/ha	3	² při zjištění výskytu ³ venkovní prostory, skleníky max. 1x/rok ¹ do BBCH 89
Cuketa	sviluška chmelová	0,16 l/ha, 600 l vody/ha	3	² při zjištění výskytu ³ skleníky max. 1x ¹ do BBCH 89
Okurka, tykev velkoplodá, meloun cukrový, meloun vodní, paprika, rajče, baklažán	sviluška chmelová	0,16–0,32 l/ha, 600–1 200 l vody/ha	3	² při zjištění výskytu ³ skleníky max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k umístění

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Chmel	30	25	16	10
Jabloň, hrušeň	25	18	14	6
Jahodník	4	4	4	4

Patras + další obchodní jméno Remora (tebukonazol 240 g/l, azoxystrobin 120 g/l), HELM AG, Německo, platnost do 31. 8. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	skvrnitost kukuřice (Kabatiella zeae)	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–65 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Kukuřice	4	4	4	4

Revystar (mefentriflukonazol 100 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 20. 3. 2030

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice	braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 2x v plodině, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen	hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene, rez ječná, padlí travní	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 2x v plodině, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Tritikale	braničnatky, rez pšeničná, rez plevová	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 2x v plodině, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: ¹k plodině

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, ječmen, tritikale	4	4	4	4

Sinopia + další obchodní jméno Toluso (metobromuron 400 g/l, klomazon 24 g/l), Belchim Crop Protection NV/SA, Belgie, platnost do 31. 10. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	ježatka kuří noha, lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	3 l/ha, 150–200 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–09; ² preemergentně max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Brambor	4	4	4	4

Steward OPZ (indoxakarb 300 g/kg), FMC Agro Česká republika spol. s r. o., Praha, platnost do 31. 10. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jabloň, hrušeň	obaleč jablečný, obaleč slupkový a pupenový, píďalka podzimní	167 g/ha, 500–1 500 l vody/ha	33	¹ BBCH 51–75 ² na počátku líhnutí housenek ³ venkovní prostory; max. 1x/rok
Broskvoň, meruňka	obaleč východní, píďalka podzimní	167 g/ha, 500–1 500 l vody/ha	33	¹ BBCH 51–65 ² na počátku líhnutí housenek ³ venkovní prostory max. 1x/rok
Třešeň, slivoň	píďalka podzimní, obaleč	167 g/ha, 500–1 500 l vody/ha	33	¹ BBCH 51–65 ² na počátku líhnutí housenek ³ venkovní prostory; max. 1x za rok
Réva	obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný	125 g/ha, 200–1 500 l vody/ha	33	¹ BBCH 13–79 ² na počátku líhnutí housenek každé generace ³ venkovní prostory max. 1x za rok
Réva	kříši, pidikříšek zelenavý	125 g/ha, 200–1 500 l vody/ha	33	² na počátku výskytu ³ venkovní prostory max. 1x za rok
Maliník, ostružiník, rybíz	obaleč	167 g/ha, 500–1 200 l vody/ha	7	¹ BBCH13–87 ² na počátku líhnutí housenek ³ venkovní prostory max. 1x/rok (venkovní prostory, fóliovník)
Brokolice, kapusta růžičková	housenky motýlů	85 g/ha, 200–800 l vody/ha	1	¹ BBCH 13–49 ² na počátku líhnutí housenek ³ venkovní prostory max. 1x/rok
Ředkev, ředkvička	housenky motýlů	85 g/ha, 200–800 l vody/ha	3	¹ BBCH 13–49 ² na počátku líhnutí housenek ³ venkovní prostory max. 2x za pěstební cyklus, max. 6x/rok, interval mezi aplikacemi 10 dnů

(Pokračování na str. 31)

inzerce



Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj, a. s., poptává ze sklizně 2019 tyto odrůdy sladovnického ječmene:

BOJOS, LAUDIS 550, MALZ, FRANCIN, OVERTURE, MANTA

Nákup ječmene zajišťují a bližší informace podají:

Václav Abraham: tel.: +420 724 617 633, e-mail: vaclav.abraham@asahibeer.cz

závod Plzeň

Jana Hythová: tel.: +420 377 062 924, +420 724 618 422, e-mail: jana.hythova@asahibeer.cz

závod Nošovice

Vladimír Rada: tel.: +420 558 602 303, +420 724 618 351, e-mail: vladimir.rada@asahibeer.cz

(Pokračování ze str. 30)
Steward OPZ (indoxakarb 300 g/kg), FMC Agro Česká republika spol. s r. o., Prah, platnost do 31. 10. 2020 (pokračování tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kapusta, kapusta kadeřavá, zelí čínské	housenky motýlů	85 g/ha, 400–800 l vody/ha	14	¹ BBCH 13–49 ² na počátku líhnutí housenek ³ venkovní prostory max. 1x/rok
Salát, špenát, byliny čerstvé	housenky motýlů	85 g/ha, 600–800 l vody/ha	1	¹ BBCH 13–49 ³ venkovní prostory max. 1x/rok
Řepka olejka	blýskáček řepkový	85 g/ha, 150–400 l vody/ha	AT	¹ do BBCH 59 ² na počátku výskytu ³ venkovní prostory max. 1x před květem
Kukuřice	zavíječ kukuřičný, bázlivec kukuřičný	125 g/ha, 200–800 l vody/ha	35	¹ BBCH 34–77 ² na počátku líhnutí housenek, podle signalizace ³ venkovní prostory max. 2x, interval mezi aplikacemi 20 dnů
Baklažán, rajče, meloun vodní, meloun cukrový	housenky	0,125 g/ha, 500–1 000 l vody/ha	1	¹ BBCH 13–89 ² na počátku líhnutí housenek ³ skleníky max. 3x, max. 6x hydroponická kultura, interval mezi aplikacemi 8–14 dnů
Kedlubn	bělásek zelný, bělásek řepový, mūra zelná	85 g/ha, 200–800 l vody/ha	3	¹ BBCH 13–49 ² na počátku líhnutí housenek max. 2x (skleníky, fóliovníky), interval mezi aplikacemi 10–14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jabloně, hrušně, broskve, meruňky, třešně, švestky	25	18	14	6
Réva vinná, maliny, ostružiny, rybíz (polní použití a fóliovníky)	7	6	6	6
Brokolice, růžičková kapusta, kapusta, kadeřávek, čínské zelí, salát, špenát, aromatické bylinky, kedlubny, ředkve, ředkvičky, řepka olejka, kukuřice (polní použití a fóliovníky)	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)				
Jabloně, hrušně, broskve, meruňky, třešně, švestky	30	20	15	10
Réva vinná	10	5	3	3

Symetra Flex (azoxystrobin 200 g/l, isoprazam 125 g/l), Adama CZ s. r. o., Dolní Břežany, platnost do 31. 3. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Řepka olejka	hlízenka obecná	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 61–69 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Řepka olejka	5	4	4	4

Xilon GR (Trichoderma asperellum kmen T34 1 x 10⁷ CFU/g), Kwizda Agro GmbH., Rakousko, platnost do 31. 5. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Slunečnice, sója	hlízenka obecná	10 kg/ha	AT	max. 1x, aplikace do půdy při výsevu
Kukuřice	fuzariózy	10 kg/ha	AT	max. 1x, aplikace do půdy při výsevu

Poznámka: AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Bylinková směs na svílušky (směs mydlice a skořice 100 %), AGRO CS a. s., Česká Skalice, platnost do 24. 9. 2029

Pro jednorázové balení 10 g

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Zelenina (plošné kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	10 g 0,5 l vody/5 m ²	–	² svílušky
Okrasné rostliny, zelenina (prostorové kultury), jádroviny, peckoviny, drobné ovoce, réva	zvýšení odolnosti rostlin	2 % (10 g/0,5 l vody)	–	² svílušky ⁴ do počátku skanutí

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, ⁴k dávkování

Pro jednorázové balení 20 g

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Zelenina (plošné kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	20 g 1 l vody/10 m ²	–	² svílušky
Okrasné rostliny, zelenina (prostorové kultury), jádroviny, peckoviny, drobné ovoce, réva	zvýšení odolnosti rostlin	2 % (20 g/1 l vody)	–	² svílušky ⁴ do počátku skanutí

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, ⁴k dávkování

Peridiam Quality 316 (vodná disperze akrylátového kopolymeru 250 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 23. 9. 2029

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	zlepšení kvality namořeného osiva	1,5–3 l/t + 15 ml/VJ Redigo M – TM (1 VJ = 50 000 zrn)	–	moření

CHRY SOPA (Chrysoperla carnea), BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Modřice, platnost do 12. 9. 2029

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Okrasné rostliny, skleníkové kultury, zelenina	mšice, molice, trásněnky	10–50 ks/m ² (larvy)	–	² na počátku výskytu ³ chráněné prostory interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, ³k umístění

(Pokračování na str. 32)

SLADOVNICKÉ JEČMENY OD SELGENU

Spitfire

- výběrová sladovnická jakost - v pilotních zkouškách největších sladoven v České republice
- vysoký až velmi vysoký výnos ve všech oblastech
- mimořádný podíl předního zrna 97 %

Francin

- odrůda doporučená na výrobu Českého piva
- velmi dobrá odolnost suchu a poléhání
- v nákupu Plzeňského Prazdroje jako surovina pro prestižní ležák Pilsner Urquell

selgen®

Stupice 24, 250 84 Sibřina
e-mail: selgen@selgen.cz • www.selgen.cz



Přehled nových ...

(Dokončení ze str. 31)

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Fusilade Forte 150 EC + další obchodní jméno Privium Forte (fluazifop-P-butyl 150 g/l), Nufarm GmbH and Co KG, Rakousko, platnost do 31. 12. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	plevele jednoděložné jednoleté	0,8–1,0 l/ha, 100–600 l vody/ha	90	¹ před květem před uzavřením řádků ² postemergentně max. 1x
Brambor	pýr plazivý	1,6 l/ha, 100–600 l vody/ha	90	¹ před květem před uzavřením řádků ² postemergentně pýr lze 2x děleně, 1. dávka 1 l/ha, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Chmel	plevele jednoděložné jednoleté	0,6 l/ha, 100–600 l vody/ha	AT	¹ na podzim po sklizni ² postemergentně max. 1x/rok
Chmel – kořenáčové školky	plevele jednoděložné jednoleté	0,6 l/ha, 100–600 l vody/ha	–	¹ po výsadbě ² postemergentně max. 1x/rok
Cibule kromě cibule jarní	ježatka kuří noha, oves hluchý, bér	0,6 l/ha, 100–600 l vody/ha	28	¹ výsevy, postemergentně; ² postemergentně max. 1x
Cukrovka, řepa krmná	bér, ježatka kuří noha, oves hluchý, plevle jednoděložné jednoleté	0,8–1 l/ha, 100–600 l vody/ha	56	¹ postemergentně ² postemergentně max. 1x
Cukrovka, řepa krmná	pýr plazivý	2 l/ha, 100–600 l vody/ha	56	¹ postemergentně; ² postemergentně pýr lze 2x děleně, 1. dávka 1 l/ha, pýr BBCH 12–13, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Fazol kromě zelené fazolky, hrách kromě zelených lusků	plevele jednoděložné jednoleté	0,8–1 l/ha, 100–600 l vody/ha	90	¹ do BBCH 50 ² postemergentně max. 1x
Lesní porosty, lesní školky	plevele jednoděložné jednoleté	0,8–1 l/ha, 100–600 l vody/ha	–	² postemergentně max. 1x/rok
Lesní porosty, lesní školky	retardace, třítina křovištní	1 l/ha, 100–600 l vody/ha	–	² postemergentně max. 1x/rok
Mrkev krmná	bér, ježatka kuří noha, oves hluchý	0,8–1 l/ha, 100–600 l vody/ha	56	¹ postemergentně; ² postemergentně max. 1x
Mrkev krmná	pýr plazivý	1,6 l/ha, 100–600 l vody/ha	56	¹ postemergentně; ² postemergentně max. 1x
Okrasné dřeviny, ovocné školky	bér, ježatka kuří noha, oves hluchý	0,6 l/ha, 100–600 l vody/ha	–	¹ od BBCH 50; ² postemergentně max. 1x/rok
Ozimá řepka	výdrol obilnin	0,5 l/ha, 100–600 l vody/ha	90	¹ do BBCH 50; ² postemergentně max. 1x
Ozimá řepka	pýr plazivý	1,6 l/ha, 100–600 l vody/ha	90	¹ do BBCH 50; ² postemergentně max. 1x
Slunečnice	plevele jednoděložné jednoleté	0,8–1 l/ha, 100–600 l vody/ha	AT	¹ do BBCH 16; ² postemergentně max. 1x
Sója	plevele jednoděložné jednoleté	0,8–1 l/ha, 100–600 l vody/ha	90	¹ do BBCH 50; ² postemergentně max. 1x
Mák setý	oves hluchý, ježatka kuří noha	0,8–1 l/ha, 100–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 16–19 ² postemergentně max. 1x
Hořčice bílá	pýr plazivý	2 l/ha, 300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–19 ² BBCH 12–20, výška 15–20 cm max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Brambor, chmel, cibule, cukrovka, hořčice bílá, mrkev, řepa krmná, ozimá řepka	15	10	5	5
Fazol, hrách, lesní porosty, lesní školky, mák setý, okrasné dřeviny, ovocné školky, slunečnice, sója	10	5	5	0

Serenade ASO (Bacillus subtilis QST 713 13,96 g/l – minimálně 1,042 x 10¹² CFU/l), Bayer AG, Německo, platnost do 30. 4. 2021

Rozsah povoleného použití

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Mrkev	padlí mířkovitých, alternariová skvrnitost	8 l/ha, 200–500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 41–49; ² pole max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Mrkev	pytiová hniloba	10 l/ha, 200–500 l vody/ha	AT	¹ ve f. 00 BBCH ⁴ aplikace do půdy se zapravením ³ pole; max. 1x
Salát	plíseň šedá, sklerotiniová hniloba salátu	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 13–49; ³ pole, skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Rajče, paprika, baklažán	plíseň šedá, alternariová skvrnitost	8 l/ha, 200–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 21–89; ³ pole, skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Rajče, paprika, baklažán	bakteriální tečkovitost rajčete, bakteriální skvrnitost rajčete	4–8 l/ha, 200–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH13–89; ³ skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Rajče, paprika, baklažán	fuzariózy	10 l/ha, 200–500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–13 ⁴ aplikace řádková ³ skleníky max. 1x
Jahodník	plíseň šedá	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 55–89; ³ pole, skleníky max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Réva	plíseň šedá	4 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 60–89; ³ pole max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů

Serenade ASO (Bacillus subtilis QST 713 13,96 g/l – minimálně 1,042 x 10¹² CFU/l), Bayer AG, Německo, platnost do 30. 4. 2021

Rozsah povoleného použití (pokračování tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jádroviny	bakteriální spála	4–8 l/ha, 500–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 60–79; ³ pole max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Řepka olejka	hlízenka obecná	2 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 60–69; ³ pole max. 2x, interval mezi aplikacemi 5 dnů
Cukrovka	cerkosporióza řepy, padlí řepy	2–4 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–49; ³ pole max. 6x, interval mezi aplikacemi 5 dnů
Okrasné rostliny, růže	padlí	5 l/ha, 500–4 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 11–85; ³ skleníky, pole max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k dávkování, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Rozsah rozšířeného použití podle čl. 51 nařízení: Menšinové použití přípravku povolené podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Réva	padlí révy	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 15–85; max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Řepka olejka, hořčice, slunečnice, mák	plíseň šedá, alternariová skvrnitost	2–4 l/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–89; max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Hořčice, slunečnice, mák	hlízenka obecná	2–4 l/ha, 200–600 l vody/ha		¹ BBCH 12–89; max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Řepa salátová, řepa krmná	cerkosporióza řepy, padlí řepné	2–4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–49 max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Pšenice, ječmen	fuzariózy klasů	2–4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 59–69 max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Pšenice, žito, tritikale	padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, bráničnatka pšeničná	2–4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 25–59 max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Ječmen, oves	padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene	2–4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 25–59 max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Brambor	kořenomorka bramborová, stříbřitost slupky bramboru	5 l/ha, 100–200 l vody/ha aplikace při výsadbě do brázd	AT	¹ BBCH 00–09
Třešeň, višeň, slivoň, meruňka, broskvoň	moniliová spála, moniliová hniloba, bakteriální spála, plíseň šedá, bakteriální skvrnitost peckovin	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Jádroviny	plíseň šedá, stemfýliová skvrnitost hrušně	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Réva	octová hniloba hroznů révy	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 79–89; max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Chmel	padlí chmelové	8 l/ha, 700–2 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–89; max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Hrách na zrno, fazol na zrno, sója, lupina, bob, peluška	plíseň šedá, hlízenka obecná	4–8 l/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–89; max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Hrách na zeleno a lusky, fazol na lusky	plíseň šedá, hlízenka obecná	4–8 l/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–79; max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Kmín kořený, světlíce barvířská	plíseň šedá, hlízenka obecná	4–8 l/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–89; max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Jahodník	padlí jahodníkové	4–8 l/ha, 700–2 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 55–89; ³ pole; max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Zelenina tykvovitá	plíseň šedá, padlí okurky	4–8 l/ha, 600–2 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–89; ³ pole, skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Zelenina košťálová	plíseň šedá, hlízenka obecná, alternariová skvrnitost	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–49; ³ pole, skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Ředkvička, ředkev	hlízenka obecná, alternariová skvrnitost	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–49; ³ pole, skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Petržel, pastinák, celer bulvový	suchá skvrnitost listů, plíseň šedá, padlí, hlízenka obecná	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–49; ³ pole max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Chřest	plíseň šedá, hlízenka obecná	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–49 max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Pór	alternariová skvrnitost póru	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–49 max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Cibule	botryotiniová skvrnitost listů cibule	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–49 max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Léčivé rostliny	plíseň šedá, hlízenka obecná, alternariová skvrnitost, padlí	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–49 ³ pole, skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Ostružník, maliník, borůvka, brusnice brusinka, rybíz, angrešt	plíseň šedá, americké padlí angreštové	4–8 l/ha, 200–1 200 l vody/ha	AT	¹ BBCH 51–85; ³ pole, skleníky max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Špenát, zelenina listová	plíseň šedá, hlízenka obecná	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 13–49; ³ pole, skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Okrasné rostliny, okrasné dřeviny	plíseň šedá, hlízenka obecná, alternariová skvrnitost, padlí růže	4–8 l/ha, 200–1 200 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–85; ³ pole, skleníky max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Brambor	hnědá skvrnitost bramborových listů	4–8 l/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–85 max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Celer listový	suchá skvrnitost listů, plíseň šedá, padlí, hlízenka obecná	4–8 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–49 ³ pole, skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Řepka olejka	fomová hniloba	2–4 l/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 14–19 na podzim, BBCH 30–40 na jaře max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k dávkování, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní