

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí dokončení přehledu přípravků s rozšířeným použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 10. až 31. 10. 2019. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

První část přehledu byla zveřejněna v týdeníku Zemědělec (3/2020).

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku (dokončení)

Jura + další obchodní jméno DEFI Evo (prosulfokarb 667 g/l, diflufenikan 14 g/l), GLOBACHEM nv, Belgie, platnost do 31. 10. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice, ozimý ječmen, ozimé žito, ozimé tritikale	plevele jednoděložné jednoleté, plevle dvouděložné jednoleté	4 l/ha, 200–300 l vody/ha	AT	¹ preemergentně, postemergentně BBCH 10–13 ² preemergentně, postemergentně BBCH 10–12 max. 1x na podzim

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ječmen, pšenice, tritikale, žito	6	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Ječmen, pšenice, tritikale, žito	5	5	0	0

Monolith (mesosulfuron-methyl 45 g/kg/ve formě sodné soli 47 g/kg, propoxykarbazon 64 g/kg/ve formě sodné soli 67,5 g/kg), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 6. 2033

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice, ozimé žito, ozimé tritikale	psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	0,2 kg/ha + 1 l/ha Biopower – TM, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 21–32 max. 1x na jaře
Ozimá pšenice, ozimé tritikale	psárka polní – silné výskyty, oves hluchý, plevle dvouděložné jednoleté	0,33 kg/ha + 1 l/ha Biopower – TM, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 21–32 max. 1x na jaře

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimá pšenice, ozimé žito, ozimé tritikale	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Ozimá pšenice, ozimé žito, ozimé tritikale	5	0	0	0

Pegaso F + další obchodní jméno Valis F, Emendo F (valifenalát 60 g/kg, folpet 480 g/kg), Belchim Crop Protection NV/SA, Belgie, platnost do 31. 7. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Réva	plíseň réвовá	1 kg/ha; do BBCH 61 2 kg/ha; od BBCH 61 100–1 000 l vody/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61)	28	¹ BBCH 15–83 BBCH ² hrozny moštové max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 10 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k určení sklizně

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Réva	10	7	6	6

4. Rozšířené použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána.

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravky platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Amistar (azoxystrobin 250 g/l), platnost do 31. 12. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	hnědá skvrnitost bramborových listů	0,5 l/ha, 400–600 l vody/ha	7	¹ BBCH 31–91 ² preventivně nebo při prvních příznacích choroby max. 3x, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Ředkev olejná	hlízenka obecná, černí řepková	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	⁶ semenné porosty max. 2x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Maliník, ostružiník	plíseň šedá, antraknóza, rez maliníková, padlí antraknózová skvrnitost	1 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	7	max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Jahodník	jahodníku, antraknózová hnílba jahod, padlí jahodníkové, bílá skvrnitost listů jahodníku	1 l/ha, 400–800 l vody/ha	3	max. 2x, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Trávy	rzi, skvrnitost listů, plíseň	0,5–1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	⁶ semenné porosty max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pažitka	plíseň cibulová	1 l/ha, 200–500 l vody/ha	14	² preventivně nebo při prvním výskytu ⁵ venkovní prostory; max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 10 dnů
Salát	alternariová skvrnitost, padlí, plíseň salátu	1 l/ha, 200–600 l vody/ha	14	² při prvním výskytu ⁵ venkovní prostory, skleníky max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, ⁴k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ředkev olejná, trávy semenné porosty, brambor, jahodník, salát, pažitka	4	4	4	4
Maliník, ostružiník	6	6	6	6

Delan Pro (dithianon 125 g/l, fosfonáty draselné 561 g/l), platnost do 31. 5. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Rybíz, angrešt	antraknóza rybízu, rez vejmutovková	2,5 l/ha, 150–500 l vody/ha	7	¹ BBCH 19–85; max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Rybíz, angrešt	antraknóza rybízu, rez vejmutovková	2,5 l/ha, 150–500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 91–95 po sklizni max. 1x za rok

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Rybíz, angrešt	14	9	6	6

Milbeknock (milbemektin 9,3 g/l), platnost do 31. 7. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Hrušeň	sviluška ovocná, sviluška chmelová, vlnovník jabloňový	1 l/ha, 500–750 l vody/ha	14	¹ BBCH 69–76 max. 1x za rok
Rybíz černý, rybíz červený, rybíz bílý, ostružiník, borůvka, maliník, klikva, angrešt	sviluška ovocná, sviluška chmelová	1,25 l/ha, 750–2 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 60–91 max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Chmel	sviluška ovocná, sviluška chmelová	1,5 l/ha, 3 300 l vody/ha	21	¹ BBCH 65–85 max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 21 dnů

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Movento 100 SC (spirotetramat 100 g/l), platnost do 30. 4. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Cibulovité okrasné rostliny, okrasné rostliny	mšice	0,75 l/ha, 200–800 l vody/ha	AT	¹ BBCH 69–89, kromě období kvetení max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ovocné dřeviny, okrasné dřeviny	mšice	0,75 l/ha, 200–800 l vody/ha	–	¹ kromě období kvetení; ² školy max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Réva	mšička révokaz	0,5–0,7 l/ha, 1 000 l vody/ha	14	¹ BBCH 69–81; max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Réva	pidikřísek révový, křísek révový	0,5–0,7 l/ha, 1 000 l vody/ha	14	¹ BBCH 60–81; max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Angrešt, bez černý, borůvka	mšice	0,75 l/ha, 500–1 000 l vody/ha	AT	¹ po sklizni; max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Meruňka, třešeň, višně, broskvoň, slivoň	puklice žestková	2,25 l/ha* (0,75 l/1 m výšky koruny/ha), 500–1 500 l vody/ha	21	¹ BBCH 69–81; max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Mrkev, celer bulvový, pastinák, petržel	mšice, dutilka hlohová	0,45–0,75 l/ha, 200–500 l vody/ha	21	¹ BBCH 12–49; max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Čekanka salátová listová	mšice, dutilka topolová	0,45–0,75 l/ha, 200–500 l vody/ha	7	¹ BBCH 13–49; max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Endívie širokolistá	dutilka topolová	0,75 l/ha, 500 l vody/ha	7	¹ BBCH 13–49 max. 1x
Brokolice, květák, kapusta, zelí hlávkové, zelí čínské, kedluben	mšice, molice vlašovičnicková, třásněnka zahradní	0,75 l/ha, 500–1 000 l vody/ha	3	¹ BBCH 12–49 max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů

*Pro použití do plodin třešeň, višně:

V dávce 2,25 l přípravku/ha (tedy při výšce koruny 3 m) lze přípravek aplikovat pouze při použití intervalu mezi aplikacemi 21 dnů.

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Okrasné rostliny nad 150 cm, ovocné a okrasné školy, meruňka, třešeň, višně, broskvoň, slivoň	6	6	6	6

NATUREN Koncentrát Proti plevelům (kyselina pelargonová 565 g/l), platnost do 31. 8. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Nezemědělská půda – propustné povrchy bez vegetace	mechy	23 ml/10 m ² , 0,5 l vody/10 m ²	–	⁴ aplikace opakovaná; max. 4x za rok, duben až listopad, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Okrasné dřeviny	mechy	bodová aplikace	–	⁴ aplikace opakovaná; max. 4x za rok, duben až listopad, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ⁴k dávkování

NATUREN Postřik Proti plevelům (kyselina pelargonová 43,1 g/l), platnost do 31. 8. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Nezemědělská půda – propustné povrchy bez vegetace	mechy	30 ml/m ²	–	⁴ aplikace opakovaná max. 4x za rok, duben–listopad, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Okrasné dřeviny	mechy	bodová aplikace	–	⁴ aplikace opakovaná max. 4x za rok, duben–listopad, interval mezi aplikacemi 7 dnů

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

Rozhodnutí nebyla vydána.

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová