

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků za období 1. 11. až 30. 11. 2019. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Fusilade Max (fluazifop-P-butyl 125 g/l), Nufarm GmbH and Co KG, Rakousko, platnost do 31. 12. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Rybíz bílý, rybíz černý, rybíz červený, angrešt	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	90	max. 1x v plodině
Brambor	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	90	¹ před květem, před tvorbou hlíz max. 1x v plodině
Mrkev	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	49	max. 1x v plodině
Petržel	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	42	max. 1x v plodině
Pastinák	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	49	max. 1x v plodině
Celer bulvový	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	49	max. 1x v plodině
Celer listový	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	42	max. 1x v plodině
Kerblík	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1–1,5 l/ha, 100–400 l vody/ha	42	max. 1x v plodině
Fenykl	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1–1,5 l/ha, 100–400 l vody/ha	49	¹ při výšce 20 cm max. 1x v plodině
Cukrovka, řepa krnná	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1–2 l/ha, 100–400 l vody/ha	56	max. 1x v plodině
Řepa salátová, mangold	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1–2 l/ha, 100–400 l vody/ha	49	max. 1x v plodině
Ozimá řepka	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	90	¹ před květem max. 1x v plodině
Hořčice bílá	plevele jednoděložné jednoleté	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	90	¹ před květem max. 1x v plodině
Vodnice, tuřín, ředkev černá, ředkev bílá	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	49	max. 1x v plodině
Cibule z výsevu, česnek, cibule šalotka z výsevu	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1–2 l/ha, 100–400 l vody/ha	28	¹ BBCH 10–39 max. 1x v plodině
Salát hlávkový	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1–1,5 l/ha, 100–400 l vody/ha	42	max. 1x v plodině
Špenát	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1–1,5 l/ha, 100–400 l vody/ha	42	max. 1x v plodině
Pažitka	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1–1,5 l/ha, 100–400 l vody/ha	42	max. 1x v plodině
Hrách – vyluštěný, čerstvý	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	¹ před květem max. 1x v plodině
Fazol – lusky, hrách – lusky	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	28	¹ před květem max. 1x v plodině
Fazol – vyluštěný, suchý	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	90	¹ před květem max. 1x v plodině
Hrách – vyluštěný, suchý	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	90	¹ před květem max. 1x v plodině
Chřest	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	42	max. 1x v plodině
Slunečnice	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	90	¹ do BBCH 15 max. 1x v plodině
Len	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	90	¹ před květem max. 1x v plodině
Chmel	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	30	¹ po sklizni max. 1x v plodině
Lesní porosty	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	max. 1x v plodině
Bob	plevele jednoděložné jednoleté, plevle jednoděložné vytrvalé	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	90	¹ před květem max. 1x v plodině

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Angrešt, len, lesní porosty, rybíz bílý, bob, brambor, celer bulvový, celer listový, chmel, chřest, fazol, hořčice bílá, hrách, mrkev, pastinák, petržel, ozimá řepka, rybíz černý, rybíz červený, slunečnice, tuřín, vodnice, ředkev bílá a černá, Chřest, cukrovka, fenykl, kerblík, pažitka, řepa krnná, řepa salátová, salát hlávkový, špenát, mangold, cibule z výsevu, česnek, cibule šalotka z výsevu	5	0	0	0
	5	5	0	0

Harpun (pyriproxyfen 100 g/l), Galenika-Fitofarmacija d. o. o., Slovinsko, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Rajče, okurka	molice skleníková	1,125 l/ha (75 ml/100 l vody) 1 000–1 500 l vody/ha	3	¹ BBCH 50–89 ² při prvním výskytu dospělých hmyzu ³ skleníky max. 2x, interval mezi aplikacemi 10–14 dnů
Jabloň	obaleč jablečný	1 l/ha, 600–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 71–74 ² na počátku kladení; ³ venkovní prostory max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Hrušeň	mera hrušňová	1 l/ha, 600–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 51–75 ² larvy ve stadiu vývoje L1–L3 ³ venkovní prostory; max. 1x za rok

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jabloň, hrušeň	35	25	20	15

KAMBA 480 SL (dikamba 480 g/l), Gharda Chemical Limited, Velká Británie, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	plevele dvouděložné	0,6 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 13–15; ² BBCH 12–16 ³ mimo množitelské porosty; max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Kukuřice	5	0	0	0

Tern 750 EC (fenpropidin 750 g/l), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice	padlí travní	0,75 l/ha, 100–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 31–65 max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen	padlí travní	0,75 l/ha, 100–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 31–65 max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Žito	padlí travní	0,75 l/ha, 200–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 31–65 max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Oves	padlí travní	0,75 l/ha, 200–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 31–65 max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Tritikale	padlí travní	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 31–65 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, ječmen, oves, žito	45	25	10	4
Tritikale	45	25	12	4

Torso (napropamid 206 g/l, metazachlor 214 g/l, chinmerak 71 g/l), GLOBACHEM nv., Belgie, platnost do 31. 7. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá řepka	lipnice roční, psárka polní, plevle dvouděložné jednoleté	2,3–3,5 l/ha, 150–400 l vody/ha	AT	¹ preemergentně max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimá řepka	7	4	4	4

VextaMitron 700 SC (metamitron 700 g/l), Vextachem s. r. l., Itálie, platnost do 31. 8. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Cukrovka, řepa krnná	lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	2 l/ha preemergentně + 1,5 l/ha postemergentně + 1,5 l/ha postemergentně 200–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–18 ² BBCH 10–12 max. 3x v plodině, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Cukrovka, řepa krnná	lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	1 l/ha postemergentně + 2 l/ha postemergentně 200–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–18 ² BBCH 10–12 max. 3x v plodině, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Cukrovka, řepa krnná	lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	1,5 l/ha postemergentně + 1,5 l/ha postemergentně + 2 l/ha postemergentně 200–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–18 ² BBCH 10–12 max. 3x v plodině, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Cukrovka, krnná řepa	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Cukrovka, krnná řepa	5	5	0	0

WISH TOP (chizalofop-P-ethyl 120 g/l), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 30. 11. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá řepka	plevele lipnicovité jednoleté	0,9 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18; ² BBCH 12–29 max. 1x
Ozimá řepka	pýr plazivý	1,25 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18; ² ve f. 15–20 cm výšky max. 1x
Sója	plevele lipnicovité jednoleté	0,9 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18; ² BBCH 12–29 max. 1x
Sója	pýr plazivý	1,25 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18 ² ve f. 15–20 cm výšky max. 1x
Slunečnice	plevele lipnicovité jednoleté	0,9 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18; ² BBCH 12–29 max. 1x
Slunečnice	pýr plazivý	1,25 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18; ² ve f. 15–20 cm výšky max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Řepka olejka ozimá, sója, slunečnice	5	5	0	0

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová