

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 12. až 31. 12. 2019. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Banjo 500 SC (fluazinam 500 g/l), Adama CZ s. r. o., Dolní Břežany, platnost do 28. 2. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	plíseň bramboru	0,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	7	max. 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Brambor	7	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Bonaca (fluroxypyr 250 g/l), Galenika-Fitofarmacie d. o. o., Slovinsko, platnost do 31. 12. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice, ozimý ječmen	plevele dvouděložné	0,6–0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–39 max. 1x v plodině

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Ozimá pšenice, ozimý ječmen	4	4	4	4

Mural (dikamba 480 g/l), Galenika-Fitofarmacie d. o. o., Slovinsko, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	plevele dvouděložné	0,75 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–15 ² BBCH 12–14 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Kukuřice	5	5	0	0

(Pokračování na str. 32)

Roundup Flex – jarní aplikace před setím

Zima bez dostatku sněhu předpokládá, že musíme velmi šetřit s půdní vláhou a omezit neproduktivní výpar. Koncem února nebo od března již může nastat čas, kdy budou podmínky vhodné pro likvidaci vzešlých plevelů před setím jarních obilnin, později pak zejména před setím kukuřice. Účinnost všech postemergentních herbicidů, tedy i glyfosátů, je za suchého a chladného počasí omezena a je pomalejší. Ještě více může být účinnost ovlivněna, pokud jsou plevely drobnější s nedostatečně vyvinutou listovou plochou.

Platí pravidlo, že čím je růst plevelů pomalejší, tím je i pomalejší a slabší účinnost glyfosátů.

Roundup®Flex však hranice použití výrazně posouvá a garantuje účinek i v nepříznivých podmínkách. Časné, ale i pozdní jaro využijeme pro svou výhodu. Čím déle plevely obrůstají, tím více jich Roundup®Flex zničí.

Aplikace přípravku Roundup®Flex proti raným druhům plevelů je ideálním řešením z několika důvodů:

- je rychlejší a efektivnější než mechanické odstranění plevelů, navíc šetří půdní vláhou,

Kalkulace ceny Roundup®Flex

	Ceníková cena (Kč/l)	Obsah glyfosátu (g/l)	Cena za 360 g/l (Kč/l)*
Glyfosát 360 g/l	170–205	360	170–205
Roundup® Klasik Pro 20 l	180	360	180
Roundup® Flex 20 l	299	480	224
Roundup® Flex 640 l	279	480	209
Jarní akce Roundup® Flex	při nákupu 160 l Roundup® Flex – 20 l zdarma při nákupu 640 l Roundup® Flex – 80 l zdarma		
Glyfosát 360 g/l			170–205
Roundup® Klasik Pro – balení 20 l			180
Roundup® Flex – balení 20 l			196
Roundup® Flex – balení 640 l			183

Poznámka: *cena za 360 g/l je cena přepočítaná na stejný obsah účinné látky.

- ve většině případů lze použít v jedné aplikaci společně s preemergentními herbicidy,
- jako náhrada mechanické operace šetří drahou naftu.

Roundup®Flex – správná volba před setím jarním

Přípravky řady Roundup® jsou tradičně používány pro odstranění zaplevelení před setím jarním. Díky novému smědce, které zaručuje účinnost ošetření i za nepříznivého jarního počasí, je Roundup®Flex ideální volbou pro jarní ošetření.

Flexibilní možnosti aplikace

Pro zemědělské podniky je důležité efektivně využívat pracovní dobu a optimalizovat používané postupy. To platí především v oblasti ochrany rostlin. Při extrémním vlhku, chladu nebo velkém suchu se mohou glyfosáty používat jen v omezené míře. Roundup®Flex však tyto hranice výrazně posouvá a garantuje účinek i v nepříznivých podmínkách. Díky tomu nejste tolik závislí na počasí a můžete se rozhodovat flexibilněji.

Nový Roundup®Flex poskytne větší časový prostor

Nechte plevely obrůst co nejdéle, čímž zvětšíte jejich listovou plochu a dosáhnete lepšího účinku přípravku. Vzhledem k proměnlivému počasí potřebujeme mít jistotu účinku i v horších klimatických podmínkách, což je pro požadovaný výsledek klíčové.

Je ošetření přípravkem Roundup®Flex drahé?

Podívejte se do ceníků a platte jen za obsaženou účinnou látku. Roundup®Flex obsahuje v 1 litru

přípravku 480 g účinné látky, což odpovídá 1,333 l Roundup® Klasik. Proto je za velmi podobné ceny jako standardní glyfosáty s obsahem účinné látky 360 g/l.

Porovnejte si nejen ceny, ale i rychlost účinku. V tabulce jsou údaje s přepočítanou cenou na stejnou koncentraci glyfosátu (360 g/l) a Roundup®Flex je plně

srovnatelný s ostatními glyfosáty při výrazně vyšší účinnosti.

Ing. Miroslav Hrobský
Bayer Crop Science

inzerce

AKCE Roundup®

Platí do 30. 6. 2020

Jarní sleva

Zvýhodněný nákup již od 1. 3. 2020

při nákupu 160 l Roundup®Flex – **20 l ZDARMA**
 při nákupu 640 l Roundup®Flex – **80 l ZDARMA**
 při nákupu 200 l Roundup®Klasik Pro – **20 l ZDARMA**
 při nákupu 640 l Roundup®Klasik Pro – **100 l ZDARMA**
 při nákupu 1000 l Roundup®Klasik Pro – **160 l ZDARMA**

Přípravky na ochranu rostlin používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte návod k použití, označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Více informací naleznete na www.roundup.cz

www.roundup.cz
 Ing. Mirek Hrobský, Bayer – Crop Science
 Monsanto ČR s.r.o.
 tel. +420 602 550 743, mirek.hrobsky@bayer.com



Účinnost přípravku Roundup®Flex aplikovaného před setím (vlevo), neošetřená kontrola (vpravo)
Foto archiv firmy

Přehled nových ...

(Pokračování ze str. 31)

Orondis Plus (oxathiapiprolin 100 g/l), DuPont CZ s. r. o., Praha, platnost do 3. 3. 2028

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Česnek, cibule, cibule šalotka	plíseň cibulová	0,2 l/ha, 200–800 l vody/ha	7	¹ od BBCH 13 ² pole max. 3x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Salát	plíseň salátu	0,15 l/ha, 200–800 l vody/ha	7	¹ BBCH 15–49 ² pole max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění

Talisman (nikosulfuron 40 g/l), Galenika-Fitofarmacija d. o. o., Slovinsko, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	ježatka kuří noha, plevle dvouděložné jednoleté	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18 ² postemergentně max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Kukuřice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu nečlověkových rostlin (m)				
Kukuřice	10	5	5	0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Unix 75 WG (cyprodinil 750 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 30. 4. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice	padlí travní, fuzariózy, stéblolam, helmintosporiíza pšenice, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná	0,7–1 kg/ha, 200–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 30–32 max. 1x v plodině
Ozimý ječmen	stéblolam	0,7–1 kg/ha, 200–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 30–32 max. 1x v plodině
Ozimý ječmen	padlí travní, rynchosporiíová skvrnitost ječmene, hnědá skvrnitost ječmene	0,7–1 kg/ha, 200–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 30–51 max. 1x v plodině

Poznámka: ¹k plodině

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimý ječmen, ozimá pšenice	4	4	4	4

V 10 (virus mozaiky pepina mírný izolát VC1 5–25 mg/l, virus mozaiky pepina mírný izolát VX1 5–25 mg/l), Valto B. V., Nizozemí, platnost do 29. 3. 2033

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Rajče	Pepino mosaic virus na rajčeti	70 l/ha, TM se syntetickým pískem 800 g/100 l jichy 3 500 l vody/ha – postřik	AT	¹ BBCH 13–51 (výška rostlin 10–30 cm) ² postřik ³ skleníky max. 1x
Rajče	Pepino mosaic virus na rajčeti	0,8 l/ha, TM se syntetickým pískem 15 g/l jichy 8 l vody/ha – nátěr na list	AT	¹ BBCH 13–61 ² nátěr na list ³ skleníky max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²k dávkování, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Rozhodnutí nebyla vydána.

inzerce

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Ataman (florasulam 22,8 g/kg, pyroxsulam 68,3 g/kg), Dow AgroSciences s. r. o., Praha, platnost do 26. 11. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice, ozimé žito, ozimé tritikale	chundelka metlice, plevle dvouděložné jednoleté	130 g/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–32 ² postemergentně max. 1x na jaře
Ozimá pšenice, ozimé žito, ozimé tritikale	plevele jednoděložné, plevle dvouděložné jednoleté	275 g/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–30 ² postemergentně max. 1x na jaře

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimá pšenice, ozimé žito, ozimé tritikale	4	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Moddus ME (trinexapak-ethyl 250 g/l), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 30. 4. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 32–49 max. 1x
Ozimý ječmen	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 32–49 max. 1x
Ozimé tritikale, ozimé žito	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,6 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 32–39 max. 1x
Jarní ječmen	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,6 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–37 max. 1x
Ozimá řepka	zvýšení odolnosti proti poléhání	1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 39–55 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Roundup Rapid (glyfosát 450 g/l/ve formě draselné soli 551 g/l), Bayer Agriculture BVBA, Belgie, platnost do 15. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Orná půda	plevele jednoleté	1,5–2,5 l/ha, 100–150 l vody/ha	AT	¹ před setím, před výsadbou ² max. 1x za rok
Orná půda	pýr plazivý, plevle vytrvalé	2,5–4 l/ha, 100–150 l vody/ha	AT	¹ před setím, před výsadbou max. 1x za rok
Orná půda	pýr plazivý, plevle vytrvalé	2,5–4 l/ha, max. 200 l vody/ha	AT	¹ po sklizni ² max. 1x za rok
Orná půda	plevele jednoleté	1,5–2,5 l/ha, max. 200 l vody/ha	AT	¹ po sklizni ² max. 1x za rok
Sady ovocné, aleje a jiné porosty	likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti	4 %	AT	² max. 1x
Jahodník	plevele přerostlé	1–1,5 l/ha (25–40% roztok)	AT	² aplikace knotovým rámem, max. 1x za rok
Jádroviny, peckoviny kromě broskvoně, réva	pýr plazivý, pcháč, mléč	2,5–4 l/ha, max. 200 l vody/ha	AT, 14	¹ OL 14 pro révu, OL AT pro jádroviny, peckoviny kromě broskvoně ² max. 2x za rok
Jádroviny, peckoviny kromě broskvoně, réva	svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá	6 l/ha, max. 200 l vody/ha	AT, 14	¹ OL 14 pro révu, OL AT pro jádroviny, peckoviny kromě broskvoně ² max. 1x za rok
Jádroviny, peckoviny kromě broskvoně, réva	turanka kanadská	1,5 l/ha, max. 200 l vody/ha	AT, 14	¹ OL 14 pro révu, OL AT pro jádroviny, peckoviny kromě broskvoně ² max. 2x za rok
Lesní hospodářství – chemická příprava pro obnovu lesa	plevele, nežádoucí dřeviny	2,5–5,5 l/ha	AT	² max. 1x za rok
Lesní hospodářství – lesní porosty	plevele, nežádoucí dřeviny	2,5–5,5 l/ha	AT	² max. 2x za rok
Lesní hospodářství – lesní školky	buřeň	2,5–4 l/ha	AT	² max. 1x za rok
Lesní hospodářství – prořezávky a probírky	hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti	15% nátěr, 4% postřik	AT	² max. 1x
Louky, pastviny	obnova TTP	2,5–5 l/ha, max. 200 l vody/ha	21	² max. 2x za rok

(Pokračování na str. 33)

Insekticidní stálice v novém balení

V roce 2001, tedy v době svého uvedení na tuzemský trh, představoval Mospilan 20 SP díky obsažené účinné látce acetamiprid ze skupiny neonikotinoidů velmi výrazný posun v boji se škůdci zemědělských plodin. Hlavní přínos byl v systemickém a translaminárním šíření rostlinou s účinkem žaludečního jedu, který je v nízkých aplikačních dávkách spolehlivý a dlouhodobý proti všem vývojovým stádiím škůdců.

Širokému používání se dodnes pro tyto svoje přednosti těší v rámci polní rostlinné výroby, ať už se jedná o ochranu řepky ozimé proti krytonoscům, blýskákům či bejlomorkám nebo ochranu porostů brambor před invazemi mandelinky. V případě máku setého se lze spolehnout na účinnost proti bejlomorci makové a porosty slunečnice bezpečně zbavit klopoušek, trásněnek a potměnků písečného.

Mospilan 20 SP

S postupem času byl však o jeho služby velký zájem i v od-

bornostech zahradnické výroby, zelinářství a ovocnářství. Doba dospívání tak postupně doprovázely registrace minoritního použití, o které požádala Ovocnářská Unie ČR, Svaz pěstitelů olejnin nebo ÚKZÚZ. Díky nim je dnes Mospilan 20 SP možné využívat v rámci ovocnářské produkce pro ochranu jabloní proti obaleči jablečnému a v případě jádrovin i pro boj se mšicemi a vlnatou krvavou. Pěstitelé peckovin získali v Mospilanu 20 SP spolehlivého partnera pro ochranu proti štítence zhoubné, v případě

ochrany třešní a višní pak ještě navíc proti květopasu peckovému, vrťuli třešňové a zobnoskám. Tyto samozřejmě spolehlivé hubí i v případě jejich výskytu ve slivoních. Ani pěstitelé drobného ovoce, tedy maliníku a ostružiníku nenechají tento insekticid v případě potřeby zásahu proti bejlomorci ostružiníkovému na holičkách.

Zahradníci zaměřením na produkci okrasných rostlin se mohou spolehnout na výbornou účinnost proti mšicím i molicím, včetně molice bavlníkové a zelinářů jej mohou použít pro spo-

lehlivou ochranu skleníkových rajčat, papriky a okurek proti mšicím.

Příznivý ekotoxikologický profil

I přes tento širokospektrální záběr hubených škůdců se Mospilan 20 SP vyznačuje v rámci insekticidů velmi příznivým ekotoxikologickým profilem, je použitelný v systémech integrované ochrany a nehubí populace dravého roztoče *Typhlodromus pyri*. Dlouhodobě je Mospilan 20 SP testován z hlediska bezpečnosti opylovačů. Vzhledem

k parametrům prvního neonikotinoidu můžeme prohlásit, že Mospilan 20 SP je naprosto bezpečný pro včely a další opylovače. Díky těmto vlastnostem tak můžeme s jeho pomocí počítat v ochraně rostlin i v následujících letech.

Praktická dostupnost

Z hlediska schopnosti rozprostřít se a ulpět na listech ošetřované kultury vyniká SP formulace. Praktická dostupnost přípravku je velmi široká díky pestrosti balení. Na trhu lze pořídit hobby balení 2 x 1,8 g

pro zahrádkáře až po půlkilové balení určené pro profesionální uživatele. Ty určité potěší nový způsob balení ve vodorozpustných sáčkích 2 x 180 g, které se na našem trhu objeví v letošním roce. Unikátní japonská účinná látka je zabalena do technologicky nejmodernější vodorozpustné folie americké výroby. Věříme, že toto řešení při zachování vysoké účinnosti přinese mnohem lepší uživatelský komfort.

Ing. Dušan Sem
Sumi Agro Czech, s. r. o.

(Dokončení ze str. 32)

Roundup Rapid (glyfosát 450 g/l/ve formě draselné soli 551 g/l), Bayer Agriculture BVBA, Belgie, platnost do 15. 12. 2023 (dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Nezemědělská půda	bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele – expandující druhy	5,5–6,4 l/ha, 300–400 l vody/ha	AT	⁴⁾ aplikace plošná, max. 1x za rok
Nezemědělská půda	nežádoucí vegetace	2,5–5 l/ha, max. 300 l vody/ha	AT	⁴⁾ max. 2x za rok
Nezemědělská půda	bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele – expandující druhy	4 %		⁴⁾ bodová aplikace, max. 1x
Zavlažovací kanály	plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny	4 l/ha, 200–300 l vody/ha	AT	⁴⁾ max. 1x za rok
Železnice	nežádoucí vegetace	4–6,4 l/ha, max. 200 l vody/ha	AT	⁴⁾ max. 1x za rok

Poznámka: ¹⁾k plodině, ²⁾k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní**Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů**

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Apl. dávka 6,4 l/ha, 6 l/ha, 5,5 l/ha, 5 l/ha a 4 l/ha	5	5	0	0
Apl. dávka 3 l/ha a 2,5 l/ha	5	0	0	0

Neprůstupné povrchy: Za účelem ochrany vodních organismů lze přípravek aplikovat maximálně na 50 % celkové ošetřované plochy.

4. Rozšířené použití nebo změna v použití pomocného prostředku**Mero 33528 (olej řepkový – methylester 733 g/l), Bayer AG, Německo, platnost do 28. 6. 2029**

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
TM s povolenými přípravky	zlepšení vlastností aplikační kapaliny	2 l/ha	*	

*OL (ochranná lhůta) se řídí přípravkem, s nímž je pomocný prostředek aplikován.

Pomocný prostředek lze použít v tank-mix směsi s přípravky Atlantis OD, Attribut SG 70, Grodyl 75 WG, Husar Star, MaisTer, Mix Double, Sekator OD, Stemat Super, Sencor Liquid, Laudis WG, Tandem Stefes FL, Serenade ASO, Decis Protech, Decis Forte, Capreno, Conviso One. Použití se vztahuje i na další obchodní jména přípravků. Přípravky ve směsi je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)**Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)**

Nařízení nebyla vydána.

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

Rozhodnutí nebyla vydána.

Přehled přípravků připravila **Barbora Venclová**

inzerce

Podpora modernizace

(opr, čtk) – Regionální agrární komora Jihočeského kraje se letos bude podílet na projektech, díky nimž se do zemědělství zavádí elektronika a robotika. Spolupracuje i na modernizaci laboratorů potravinářské školy ve Veselí nad Lužnicí, kde si budou moci zemědělci nechat zdarma otestovat vzorky plodin. Řekla to ředitelka jihočeské agrární komory Hana Štátná. Letošní rozpočet komory je 2,2 milionu korun.

Komora uspořádá letos asi dvacet vzdělávacích akcí a proškolí dva tisíce zemědělců i starostů a studentů. „Letošek je zlomový v nastavování podmínek nové zemědělské politiky. Budeme se snažit, aby měla jednodušší pravidla a aby zemědělci měli minimálně stejné podpory jako dosud,“ řekla ředitelka.

Agrární komora se zaměří na projekty spjaté s elektronikou. Loni propagovala hledání srnčat při seči pomocí dronů. Spolupracovat bude na zavádění robotiky v oboru. Se skupinou Leading Farmers chystá pilotní projekty pro zkoušku robotických pleček a secích strojů. Spolupracuje i s tábořskou firmou Agrosoft, která vyvíjí software pro chov dojníc. Komora podporuje i platformu pro bezpečné elektronické obchodování s komoditami, také modernizaci laboratorů SOŠ ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Zemědělci si tam budou moci zdarma nechat udělat analýzu výrobků,

co se týče obsahu pesticidů a látkového složení.

Jihočeská komora se podílí i na projektu takzvaného chytrého ječmene pivovaru Samson ze

din, protože jsme pořád ‘dobytkařským’ krajem. Máme výhodu, že pěstování krmných plodin je příznivé z hlediska zadržování vody, pomáhá tomu i or-



Jeden z řady projektů se týká pěstování ječmene

Foto archiv

skupiny AB InBev. Analytici v něm radí zemědělcům, jaký typ ječmene používat a jak se o něj starat. Čeští zemědělci patří podle ředitelky v tomto ohledu k nejvzdělanějším na světě.

Komora bude rovněž iniciovat opatření, aby zemědělci lépe zvládali dopady sucha a kůrovcové kalamity. „Základem je, aby měli pestrou skladbu plo-

ganická hmota od zvířat,“ řekla ředitelka.

Počty skotu k dubnu 2019 v kraji meziročně vzrostly. „Podařilo se zavést podpory: zemědělci mají podpory na masná telata, na zlepšení podmínek v chovech dojníc. Nově by se měl podporovat výkrm býků, jsou i cílené podpory na dodávky mléka v nejvyšší kvalitě,“ řekla Štátná. ■

U ZRODU VAŠEHO ÚSPĚCHU

GRANULOVANÁ HNOJIVA

LOVOFERT LAV 27
LOVOFERT LAD 27
LOVOFERT LAS 24+6S
LOVODASA 25+12S
LOVODASA 26+13S
Granulovaná směsná hnojiva NPK/NP
LOVOGRAN
LOVOGRAN B
LOVOGRAN IN
LOVOSTART GSH NP 6-28+7S
se stopovými živinami
ZEORIT 8-10-10+9S

LISTOVÁ HNOJIVA

BOROSAN Humine
FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
Lovo CaN
Lovo CaN T
LOVOHUMINE K
LOVOHUMINE N
LOVOHUMINE NP+Zn
LOVOFOS
LOVOSUR
MANGAN Forte
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
ZINKOSOL Forte

KAPALNÁ HNOJIVA

LOVODAM 30

Žádejte u svých
distributorů hnojiv.

www.lovochemie.cz