

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 2. až 29. 2. 2020. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější údaje.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Afrodyta 250 SC (azoxystrobin 250 g/l), Pestila II Sp. z o. o. sp. k., Polsko, platnost do 31. 12. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice	padlí travní, bráničnatka pšeničná, helmintosporiíza pšenice	0,8–1 l/ha, 200–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 31–39, max. 1x

Poznámka: ¹k plodině

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimá pšenice	4	4	4	4

BotaniGard OD (Beauveria bassiana kmen GHA 22 miliard CFU/ml), MYCOTECH EUROPE LTD., Velká Británie, platnost do 30. 4. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jahodník	molice skleníková, molice bavlníková	1,5 l/ha, 600–1 200 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–97; ² skleníky max. 12x/rok, interval mezi aplikacemi 5–7 dnů
Baklažán	molice skleníková, molice bavlníková	1,8 l/ha, 500–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–99; ² skleníky max. 25x, interval mezi aplikacemi 5–7 dnů
Cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, okurka	molice skleníková, molice bavlníková	1,8 l/ha, 500–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–99; ² skleníky max. 10x v plodině, interval mezi aplikacemi 5–7 dnů
Paprika	molice skleníková, molice bavlníková	1,8 l/ha, 500–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–99; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–7 dnů
Květiny k řezu	molice skleníková, molice bavlníková	1,5 l/ha, 500–1 200 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–99; ² skleníky max. 25x/rok, interval mezi aplikacemi 5–7 dnů
Růže	molice skleníková, molice bavlníková	1,8 l/ha, 500–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–99; ² skleníky max. 25x/rok, interval mezi aplikacemi 5–7 dnů
Okrasné školky, trvalky	molice skleníková, molice bavlníková	1,2 l/ha, 500–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–99; ² skleníky max. 10x/rok, interval mezi aplikacemi 5–7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Clentiga (imazamox 12,5 g/l, chinmerak 250 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 30. 4. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá řepka pouze odrůdy tolerantní k látce imazamox	plevele dvouděložné jednoleté	1 l/ha + 1 l/ha Dash HC – TM, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–18, na podzim ² postemergentně max. 1x v plodině
Ozimá řepka pouze odrůdy tolerantní k látce imazamox	plevele dvouděložné jednoleté	1 l/ha + 1 l/ha Dash HC – TM, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–50, na jaře ² postemergentně max. 1x v plodině
Jarní řepka pouze odrůdy tolerantní k látce imazamox	plevele dvouděložné jednoleté	1 l/ha + 1 l/ha Dash HC – TM, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–18 ² postemergentně max. 1x na jaře

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Ozimá řepka, jarní řepka	5	5	0	0

Corrib (prochloraz 300 g/l, epoxykonazol 75 g/l), Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irsko, platnost do 30. 4. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá a jarní pšenice	bráničnatka pšeničná, rez pšeničná	1,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–69 max. 1x v plodině

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimá a jarní pšenice	4			

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Isonet T [(E,Z,Z)-3,8,11-tetradekatrien-1-yl acetát 720 g/kg, (E,Z)-3,8-tetradekadien-1-yl acetát 83 g/kg], CBC (Europe) S. r. l., Itálie, platnost do 31. 8. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Rajče, paprika, baklažán	makadlovka	800–1 000 ks feromonových odparníků/ha	–	² před začátkem náletu motýlů; ³ skleníky max. 3x v plodině, interval mezi aplikacemi 110–160 dnů

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, ³k umístění

Sanvino (amisulbrom 50 g/kg, folpet 500 g/kg), Adama CZ s. r. o., Dolní Břežany, platnost do 31. 7. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Réva	plíseň révy	0,75 kg/ha do BBCH 61 1,5 kg/ha od BBCH 61 400–1 600 l vody/ha (max. 800 l/ha do BBCH 61)	28	¹ BBCH 14–83 ² hrozny moštové max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 12 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k určení sklizně

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Réva	9	6	6	6

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Zorvec ENDAVIA [benthiavalikarb (ve formě isopropylu) 70 g/l/62,3 g/l jako benthiavalikarb, oxathiapropilol 30 g/l], DuPont CZ s. r. o., Praha, platnost do 31. 7. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	plíseň bramboru	0,4 l/ha, 200–600 l vody/ha	7	¹ od BBCH 21 max. 3x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Cibule, česnek	plíseň cibulová	0,5 l/ha, 200–800 l vody/ha	28	¹ od BBCH 21 max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Rozhodnutí nebyla vydána.

(Pokračování na str. 25)

inzerce

Fungicidní ochrana jarních obilnin

Letošní jaro přišlo opět brzy a setí jarních obilnin je u konce. Aby ten letošní rok dopadl v pěstování hlavně jarních ječmenů co nejlépe, na to bude mít zásadní vliv nejen průběh počasí a dostatečné srážky, ale i kvalitní fungicidní ochrana.

Společnost Corteva Agriscience nabízí širokou škálu fungicidních přípravků, ze které si určitě vybere každý pěstitel. Jsou zde zastoupeny fungicidy pro všechny oblasti pěstování jarních obilnin, proti všem hlavním chorobám a hlavně za velice výhodnou cenu. Navíc jsou v nabídce kvalitní fungicidní přípravky i pro porosty, které se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodních zdrojů.

Cenově výhodné a kvalitní proti padlí travnímu

První fungicidní ošetření je zásadní u odrůd jarních ječmenů, které jsou náchylné na padlí travní. Rané napadení tímto patoge-

nem totiž dokáže značně zredukovat počty odnoží, brání rozvoji kořenů rostliny a tím se velice citelně snižuje i výnos obilniny.

V nabídce jsou hned dva speciální přípravky proti padlí travnímu – Atlas S a Talus®. Oba uvedené přípravky v dávce 0,15 až 0,2 l/ha a při včasné aplikaci zabrání rozvoji choroby po dobu 6–8 týdnů. Přípravky navíc působí i na fyziologii samotné rostliny obilniny a stimulují její přirozené obranné mechanismy proti dalším patogenům.

Zaručená ochrana proti listovým chorobám

Kvalitní ochrana zejména praporcového listu je pojistka dob-

řých výnosů porostů obilnin obecně. Hlavní listové choroby, jako jsou bráničnatky, hnědá, rynchosporiová nebo ramulariová skvrnitost se v jarních obilninách vyskytují ve větší nebo menší míře prakticky každou sezónu. V posledních letech se k nim kvůli suchému průběhu počasí stále více přidávají rzi.

Pro intenzitní oblasti pěstování jařin je určen přípravek Allegro Plus, kde je jeho aplikace vysoce návratná. Tento přípravek v dávce 0,6–0,8 l/ha působí prakticky na kompletní spektrum chorob od padlí přes bráničnatky, DTR, rzi, hnědou a rynchosporiovou skvrnitost až po fuzárie v kla-

se. A v neposlední řadě má výrazný fyziologický efekt na rostlinu, jelikož podporuje asimilační proces obilniny a tím pomáhá navyšovat výnosový potenciál porostů.

Pro hlavní ošetření porostů jarních obilnin v oblastech, kde byla potvrzena rezistence houbových chorob vůči strobilurinu, je určen fungicid nové generace Bell Pro. Má vynikající účinek na padlí, bráničnatky, rzi a na ramulariovou a hnědou skvrnitost.

Dalším širokospektrálním fungicidním přípravkem je Soligor®. Jedná se o tříložkový fungicid, který má silný stop efekt na padlí a působí na kompletní

spektrum chorob v jarních obilninách, včetně ramulariové skvrnitosti a DTR. Jeho aplikace je výhodná zejména pro včasné ošetření odrůd ječmenů, které jsou náchylné na napadení padlím travním. Má výborný preventivní, kurativní a eradikativní účinek a je bez omezení pro aplikaci v OP II. stupně.

Výhodné i proti klasovým chorobám

Již zmiňovaný přípravek Soligor je možné aplikovat i později, na začátku kvetení obilniny na potlačení fuzarií a proti rzi.

Pro aplikaci do květu je vhodný přípravek Caramba®, který veli-

ce dobře účinkuje proti klasovým chorobám a je ideální i jako TM partner pro další fungicidní přípravky, kde posiluje účinek i proti rzi a je bez omezení v ochranných pásmech II. stupně vodních zdrojů.

A velice cenově výhodná aplikace je přípravkem Lynx, který je také určen k pozdnímu použití proti klasovým chorobám a rzi.

Věřme, že z naší široké nabídky fungicidních přípravků si vybere každý pěstitel jarních obilnin a přispějeme tak k dobré a kvalitní sklizni.

Ing. Michaela Hospodková
Corteva Agriscience

(Dokončení ze str. 24)

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Ampexio (mandipropamid 250 g/kg, zoxamid 240 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 1. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Réva	plíseň révová	0,25 kg/ha do BBCH 61; 0,5 kg/ha od BBCH 61 150–1 000 l vody/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61)	21	¹ BBCH 13–85; max. 2x/rok, interval mezi aplikacemi 8 dnů

Poznámka: ¹k plodině

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Réva	14	9	6	6

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Carial Flex (cymoxanil 180 g/kg, mandipropamid 250 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 8. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	plíseň bramborová	0,6 kg/ha, 200–600 l vody/ha	7	¹ BBCH 59–91 ² podle signalizace max. 3x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Brambor	4	4	4	4

4. Rozšířené použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána.

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nariadení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravky platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Enervin SC (ametoktradin 200 g/l), platnost do 31. 7. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pór	zasychání špiček listů póru	1,2 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	7	¹ BBCH 11–48 max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině

Evito T (fluoaxastrobín 180 g/l, tebukonazol 250 g/l), platnost do 31. 7. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Hořčice	hlízenka obecná	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	56	¹ BBCH 61–70 max. 1x
Mák setý	hlízenka obecná	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	56	¹ BBCH 61–70 max. 1x
Len setý	hlízenka obecná	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	56	¹ BBCH 61–70 ⁶ přádný, olejný max. 1x
Lnička setá	hlízenka obecná	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	56	¹ BBCH 61–70 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ⁶k určení sklizně

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Hořčice, mák, len, lnička	25	12	6	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Fresco (metobromuron 400 g/l), platnost do 31. 12. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Fazol	plevele	2–2,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–08; ² preemergentně max. 1x na jaře
Pastinák	plevele	1,25–2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–08; ² preemergentně ⁶ semenné porosty max. 1x na jaře
Hlíznaté okrasné rostliny, cibulovité okrasné rostliny	plevele	1,25–2,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–08; ² preemergentně max. 1x na jaře nebo na podzim
Chřest	plevele	2,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ po sklizni; ² preemergentně max. 1x červenec–srpen
Slunečnice (okrasná)	plevele	2,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–08; ² preemergentně ⁶ pro produkci květů max. 1x březen–květen

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ⁶k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Fazol, pastinák, hlíznaté okrasné rostliny, cibulovité okrasné rostliny, slunečnice okrasná, chřest	4	4	4	4

Pro aplikaci do hlíznatých okrasných rostlin a cibulovitých okrasných rostlin: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. Pro aplikaci do pastináku: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Kabuki (pyraflufen-ethyl 26,5 g/l), platnost do 30. 6. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jetel inkarnát, jetel luční	desikace	0,8 l/ha + smáčedlo (TM), 200–400 l vody/ha	14	¹ 14 dní před sklizní; ⁶ semenné porosty max. 2x v plodině, interval mezi aplikacemi 5–7 dní

Poznámka: ¹k plodině, ⁶k určení sklizně

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jetel inkarnát, jetel luční	18	8	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Jetel inkarnát, jetel luční	20	10	5	5

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Ranman Top (kyazofamid 160 g/l), platnost do 31. 7. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Rajče, baklažán, okurka, cuketa	plíseň	0,5 l/ha, 400–1 200 l vody/ha	3	¹ od BBCH 15; max. 6x v plodině, interval mezi aplikacemi 7–10 dní

Poznámka: ¹k plodině

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Rajče, baklažán, okurka, cuketa	4	4	4	4

Serenade ASO (Bacillus amyloliquefaciens/původně subtilis kmen QST 713 13,96 g/l), platnost do 30. 4. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	fuzariózy	2–6 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 59–69 max. 2x v plodině, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Pšenice, žito, tritikale	čerrň na obilninách, plíseň sněžná, braničnatka plevová	2–4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 65–77 max. 2x v plodině, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Ječmen, oves	čerrň na obilninách, plíseň sněžná, hnědá skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene	2–4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 65–77 max. 2x v plodině, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Tykev olejná	plíseň šedá, padlí dýňovitých	4–8 l/ha, 600–3 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–89; ⁵ pole max. 6x, interval mezi aplikacemi 5–14 dnů
Okurka	pyťové vadnutí dýňovitých, fuzariové vadnutí okurky	8 l/ha, 600–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–09; ² pole, skleníky zapravení do půdy před výsevem
Žampiony	plíseň zelná	40 ml, 200–300 ml vody/100 kg substrátu	AT	¹ ve fázi BBCH 00; aplikace do půdy

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)


EDN (ethandinitril 970 g/kg), platnost od 1. 3. 2020 do 28. 6. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Smrk ztepilý (vytěžené kmeny)	lýkožrout smrkový, lýkožrout severský	50 g/m ³	–	⁵ sklady dřeva, skládky dřeva v lese fumigace

Poznámka: ⁵k umístění

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová

— inzerce —



NĚKTERÁ SPOJENÍ JEDNODUŠE FUNGUJÍ LÉPE

- + Výkonná: jedinečná kombinace účinných látek
- + Spolehlivá: široké spektrum účinnosti v obilninách
- + Nezávislá: za všech podmínek

Avoxa® syngenta

Avoxa je registrovaný ochranný známý znak společnosti Syngenta Crop Protection, LLC. Všechny ostatní názvy jsou vlastnictvím jejich respective owner. © 2019 Syngenta Crop Protection, LLC. www.syngenta.cz