

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 3. až 31. 3. 2020. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Difure Solo (difenokonazol 250 g/l), GLOBACHEM nv., Belgie, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Cukrovka, řepa krmná	rez řepná	0,5 l/ha, 200–300 l vody/ha	21	¹ od BBCH 39 max. 2x v plodině, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Cukrovka, řepa krmná	4	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Shiro + další obchodní jméno Grando (triflusalufuron 486 g/kg), UPL Europe Ltd., Velká Británie, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Cukrovka, řepa krmná	plevele dvouděložné jednoleté	30 g/ha, 80–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–39 ² BBCH 10–12 max. 4x v plodině, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Cukrovka, krmná řepa	4	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Rozhodnutí nebyla vydána.

inzerce

Vykročte vstříc úspěchu

Průběh klimatických podmínek během vegetace ozimé řepky se za poslední roky mění a řepka čím dál častěji musí čelit nepříznivým obdobím, ne každá odrůda si s tím umí dobře poradit. Společnost SOUFFLET AGRO se usilovně zabývá ve svém projektu SOUFFLET SEEDS testováním stávajících a nových odrůd ozimé řepky v různých půdně-klimatických podmínkách, tak abychom mohli nabídnout našim zákazníkům vysoce výnosné a plastické hybridy ozimé řepky na českém, ale i slovenském trhu.

Z již na trhu známých a praxí prověřených hybridů nabízíme pro vegetační rok 2020/2021 hybridy Estelia a Addition. Z nových nadějných hybridů nabízíme Olimpico, Miami a v exkluzivním zastoupení od společnosti BASF hybrid Armani.

Estelia

S hybridem Estelia se na polích, ať už v pokusech nebo na produkčních polích, setkáváme již čtyři roky. I když genetika jde stále kupředu, tak Estelia je pořád schopná se úspěšně měřit s těmi nejvýkonnějšími hybridy na trhu. Jedná se o středně raný hybrid středního vzrůstu, s velice dobrým zdravotním stavem. Start do vegetace je středně rychlý až rychlý, velice dobrá mrazuvzdornost, start do jarní vegetace je středně rychlý. Estelia disponuje dobrou stabilitou a nepolehá. Dobře odolává přísušku, a i na horších stanovištích poskytuje nadprůměrné výnosy. V loňském nelehkém vegetačním roce 2019 patřila na řadě míst k nejvýkonnějším hybridům. Další negativní fenomén loňské vegetace byla

nízká olejnatost, ale i s tou si Estelia poradila na výbornou a své pěstitele neklamala.

Addition

Druhým praxí prověřeným hybridem je Addition. Jedná se o moderní, extrémně výnosný hybrid vysokého vzrůstu s vyšlechtěnou rezistencí k viru žloutenky vodnice (TuYV). Tento hybrid má vynikající vitalitu vzházení, kterou prokázal v suchém roce 2018 v maloparcelkovém pokusu v Červeném Újezdě společnosti Agrada s.r.o. Při sklizni tohoto pokusu, ve kterém bylo umístěno 55 odrůd, byl Addition nejlepším s výnosem 6,5 t/ha. Addition potvrdil svůj vysoký výnos i na dalších pokusných lokalitách, kde se ve výnosu umísťoval mezi nejlepšími. Svůj enormní výnosový potenciál potvrdil i ve sklizni 2019 na produkčních plochách, kde patřil na řadě podniků k nejlepším.

Olimpico

Olimpico je středně pozdní hybrid, který se zaměřuje na kombinaci nadprůměrného výnosu a velmi vysoké olejnatosti.

Tento hybrid má velmi dobrý zdravotní stav podpořen geny proti fomové hnilobě RLM 1, 9, 7. Je vysokého vzrůstu, ale i přes svůj vysoký vzrůst nepolehá. Olimpico je registrovaný na Slovensku, kde během registrace dosahoval nadprůměrných výsledků ve všech výrobních oblastech s obsahem oleje v sušině 48,1 %.

Novinky

Nejnovější hybrid v portfoliu Soufflet Seeds je Miami, který se projevuje středním vzrůstem, rychlým startem do vegetace, dobrým zdravotním stavem, vylepšenou odolností proti fomové hnilobě genem RLM 1 a dobrou mrazuvzdorností.

Novinka Armani patří do skupiny moderních hybridů, které mají v genotypu rezistenci proti viru žloutenky vodnice (TuYV). Je středně raný, vysokého vzrůstu, s rychlým startem do vegetace, vysokou olejnatostí a vysokým potenciálem výnosu, který potvrdil v roce 2018 při registraci v Německu.

Ing. Petr Fuksík
SOUFFLET AGRO a. s.

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Impact (flutriafol 125 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 5. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ječmen	padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene	1 l/ha, 150–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–55 max. 1x
Pšenice	rez plevová, rez pšeničná, bráničnatka plevová	1 l/ha, 150–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–55 max. 1x
Ozimé tritikale	rez pšeničná, bráničnatka plevová	1 l/ha, 150–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–55 max. 1x
Ozimá řepka	plíseň šedá, alternariová skvrnitost brukvovitých, hlízanka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 60–67 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Pulsar 40 + další obchodní jméno Piorun, Passat (imazamox 40 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 31. 10. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Slunečnice – IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)	plevele jednoděložné jednoleté, plevy dvouděložné jednoleté	1,25 l/ha, 100–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–16 ² postemergentně max. 1x
Sója luštěnatá	plevele jednoděložné jednoleté, plevy dvouděložné jednoleté	1,25 l/ha, 100–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–16 ² postemergentně ³ mimo množitelské porosty max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Slunečnice, sója	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Slunečnice, sója	5	5	0	0

(Pokračování na str. 25)

inzerce

PRÉMIOVÉ OSIVO ŘEPKY OZIMÉ

- ◊ **ESTELIA**
kombinace velmi vysokého výnosu a plasticity k pěstebním podmínkám
- ◊ **ADDITION**
extrémně výnosný hybrid s TuYV resistencí, výborným zdravotním stavem, který nezklame
- ◊ **OLIMPICO**
nadprůměrný výnos v kombinaci s velmi vysokou olejnatostí
- ◊ **MIAMI**
nadějná, výnosná, nepolehává novinka



www.soufflet-agro.cz

(Dokončení ze str. 24)
Listego (imazamox 40 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 31. 10. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Slunečnice – IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)	plevele jednoděložné jednolété, plevle dvouděložné jednolété	1,25 l/ha, 100–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–16 ² postemergentně max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Slunečnice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Slunečnice	5	5	0	0

Neudosan AF + další obchodní jméno Přípravek proti škůdcům (draselná sůl přírodních mastných kyselin 10,2 g/l), W. Neudorff GmbH. KG, Německo, platnost do 31. 8. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Okrasné rostliny, okrasné dřeviny	molice, mšice, svilušky	podle návodu	–	² od začátku výskytu ⁴ do počátku skanutí max. 3x/rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Jádroviny	mšice kromě vlnatky krvavé	podle návodu	–	² od začátku výskytu ⁴ do počátku skanutí max. 3x/rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Peckoviny, jahodník, bobuloviny	mšice	podle návodu	–	² od začátku výskytu ⁴ do počátku skanutí max. 3x/rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Zelenina	molice, mšice, svilušky	podle návodu	–	² od začátku výskytu ⁴ do počátku skanutí max. 3x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, ⁴k dávkování, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

4. Rozšířené použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána.

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nariadení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nariadení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Nariadení nebyla vydána.

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

Rozhodnutí nebyla vydána.

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová

Zájem o sazenice jahod


(opr, čtk) – Zájem o sazenice z vraňanské jahodárny roste. Stoupala též poptávka například po cibuli a bramborách, protože nyní lidé doma více vaří z čerstvých surovin. Kromě sazenic ja-

Vyšší zájem je nejen o klasický typ jahodových sazenic, ale také o sazenice, které je možné pěstovat v nádobách například na terase nebo na balkonu. Ročně ve Vraňanech vyprodukuje zhru-

obchod i maloobchod,“ uvedla Hančová.

Pokud úrodu jahod nepoškodí mrazy nebo jiné výkyvy počasí, jsou ve Vraňanech schopni sklídit až 400 tun čerstvých plodů. Část sklizně jde do prodejny a část je určena pro samosběr, který obvykle začíná zkraye června. „Věříme tomu, že samosběr bude probíhat,“ dodala Hančová.

I zde se potýkají s nedostatkem pracovníků. Situaci zkomplikovalo uzavření hranic, proto nemohou přijet zahraniční pracovníci a podle Hančové Češi už moc v oboru pracovat nechťejí. Nyní se situace mírně změnila tím, že někteří lidé přišli o práci nebo ještě nemohou kvůli opatřením vlády vykonávat své povolání. „Snad to vše zvládneme, ale nebude to jednoduché, protože lidí na sklizeň je potřeba hodně,“ dodala Hančová.



O úrodě rozhodne vývoj počasí v následujících dnech Foto archiv

hod ve Vraňanech nabízejí i sazenice různých druhů zeleniny. I pro ně v poslední době míří stále více zákazníků, řekla za Jahodárnu Vraňany Dagmar Hančová.

ba dva miliony sazenic, vyvázejí je i na Slovensko. Velkoobchod pozastavila opatření spojená s epidemií covid-19. „Situace už se nyní obrátila a běží velko-

Vysadí půl milionu stromů

(fia) – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny vysadí asi půl milionu sazenic stromů na ploše 104 hektarů. Důvodem je kůrovcová těžba, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Filip Vrána. Školní podnik spravuje lesy univerzity. Loni vysadil sazenice na 46 hektarech, o rok dříve na 30 hektarech. Lesníci využívají zčásti sazenic z vlastních školek, zbytek dokupují. Náklady na jeden vysazený strom včetně lidské prá-

ce a transportu vyjdou podle Vrány zhruba na deset korun. Výsadba začala v polovině března. „Vysazujeme zejména listnaté stromy, jako dub, aby byly lesy do budoucna odolnější. Celkem je to letos 16 druhů dřevin,“ uvedl ředitel školního podniku Tomáš Vrška. S vysazováním nových stromů pomáhají lesníkům studenti univerzity, kteří mají nyní přerušenu kontaktní výuku. V lesích je jich kolem patnácti. Pomáhají ve školkách při vyzve-

dávání sazenic a při třídění. Část z nich pak sází stromy přímo v lese. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně. Lesní pozemky univerzity mají rozlohu 10 205 hektarů, vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj Brna až k Blansku. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Ř E P K A O Z I M Á

CORZAR

NOVINKA 2020

- vysoký výnos semene v obou oblastech
- nízké rostliny odolné k poléhání
- výnos oleje vysoký