

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí dokončení přehledu přípravků s rozšířeným použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 6. až 30. 6. 2020. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

4. Rozšířené použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Albit Max (kyselina poly-beta hydroxymáslá 2 g/l), MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED, s. r. o., Praha, platnost do 15. 10. 2028

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míselnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Bob	podpora zdravotního stavu	40 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Brambor	podpora zdravotního stavu	50 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Cukrovka	podpora zdravotního stavu	40 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Chmel	podpora zdravotního stavu	50–100 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Hrách	podpora zdravotního stavu	40 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Jahodník	podpora zdravotního stavu	40 ml/ha	AT	¹ od BBCH 11 ² houbové choroby
Jádroviny	podpora zdravotního stavu	100 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Kukuřice	podpora zdravotního stavu	40 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Mák setý	podpora zdravotního stavu	60 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Obilniny	podpora zdravotního stavu	40 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Peckoviny	podpora zdravotního stavu	200 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Réva	podpora zdravotního stavu	200 ml/ha	AT	¹ od BBCH 11 ² houbové choroby
Řepka olejka	podpora zdravotního stavu	60 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Růže	podpora zdravotního stavu	70 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Slunečnice	podpora zdravotního stavu	40 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Sója	podpora zdravotního stavu	40 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby

Albit Max (kyselina poly-beta hydroxymáslá 2 g/l), MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED, s. r. o., Praha, platnost do 15. 10. 2028 (pokračování tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míselnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Zelenina	podpora zdravotního stavu	30 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Zelenina košťálová	podpora zdravotního stavu	50 ml/ha	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Bob, hrách, sója	podpora zdravotního stavu	75 ml/t	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Brambor	podpora zdravotního stavu	100 ml/t	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Kukuřice, cukrovka, obilniny, řepka olejka	podpora zdravotního stavu	100 ml/t	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Mák setý	podpora zdravotního stavu	150 ml/t	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Slunečnice	podpora zdravotního stavu	600 ml/t	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby
Zelenina	podpora zdravotního stavu	2 ml/kg	AT	¹ od BBCH 12 ² houbové choroby

Pomocný prostředek se používá k podpoře zdravotního stavu a zvýšení odolnosti rostlin při aplikaci moření proti houbovým chorobám přenosným osivem a půdou a při aplikaci postřikem proti chorobám:
bob – bílá hniloba bobu, hnědá skvrnitost bobu, šedá plísnovitost hrachu,
brambor – hnědá skvrnitost bramborových listů, aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru, kořenomorka bramborová, plíseň bramboru,
cukrovka – padání klíčících rostlin, cercosporiíza řepy, větevnatka řepná, plíseň řepná,
chmel – padlí chmele, plíseň chmele,
hrách – kořenové hniloby, bílá hniloba hrachu, plíseň hrachu, šedá plísnovitost hrachu,
jahodník – plíseň šedá jahodníku, fytoftorová hniloba jahodníku, padlí jahodníkové,
jádroviny – strupovitost jabloně, padlí jabloňové,
kukuřice – sněť kukuřičná, padání klíčících rostlin, spála kukuřičná, rez kukuřičná,
mák setý – bílá plísnovitost máku, plíseň máku, spála máku,
obilniny – rez travní, černání pat stébel, rez pšeničná, rez plevová, sněť mazlavá pšeničná, padlí travní, sněť prašná pšeničná a ječná, fuzariózy klasů pšenice a ječmene, braničnatka pšeničná, plíseň sněžná, stéblová, sněť zakrslá, rez ječná, pruhoovitost ječmene, nychosporiíza skvrnitost ječmene, ramulariíová skvrnitost ječmene,
peckoviny – strupovitost peckovin, moniliová hniloba, padlí broskvoňové,
réva – padlí révy, plíseň révy, plíseň šedá,
řepka olejka – hlízenka obecná, formové černání krčku, nádorovitost brukvovité zeleniny, padlí brukvovitých, plíseň zelná, plíseň šedá,
růže – rez růžová, padlí růžové, černá skvrnitost růže,
slunečnice – alternariíová skvrnitost slunečnice, hlízenka obecná, formová hniloba slunečnice, plíseň slunečnice, plíseň šedá,
sója – kořenové hniloby, hlízenka obecná, plíseň šedá,
zelenina – suchá skvrnitost listů mrkve, padlí miřkovitých, septoriíza celeru, antraknóza salátu, plíseň salátu, hnědá skvrnitost rajčat, fusariíové vadnutí rajčete, padlí rajčete, septoriíza rajčat,
zelenina košťálová – alternariíová skvrnitost brukvovitých, nádorovitost brukvovité zeleniny, kořenové hniloby, plíseň zelná.

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

(Pokračování na str. 29)

inzerce



DAGMAR

PROVĚŘENÁ I PRO POZDNÍ SETÍ



Nejlépe hodnocená odrůda na ÚKZÚZ v odolnosti proti klasovým fuzariózám

- Nejpěstovanější registrované Áčko v ČR
- Vysoký a stabilní výnos ve všech oblastech včetně kukuřičné
- Vhodná pro pozdní setí, po obilnině i kukuřici
- Výborná odolnost klasovým fuzariózám – nejnižší kumulace mykotoxinů v zrnu
- Vynikající zimovzdornost
- Stabilní kvalita A s vysokou a stabilní objemovou hmotností, odolná porůstání

www.lgseeds.cz

Slechteer uw succes

Limagrain



AVENUE

JEŠTĚ JE ČAS NA SETÍ

9,66* t/ha
DEMO Kujavy



Nejvýnosnější odrůda v Kujavách 2020 - 9,66 t/ha

* výnos v neoseťové variantě, důkaz vysoceho zdraví a vynikající odolnosti proti polehání

podnik	výnos (t/ha)	výměra (ha)	okres
Statek Kodylinov, s.r.o. (1. v pokuse)	9,7	1,68	Hradec Králové
Ing. Stanislav Zborílek	9,2	2,4	Prostějov
ELITA a.s. Ořešchov (8. v pokuse z 34)	8,8	0,06	Brno Venkov
První zemědělská Zahornice, a.s.	8,4	96	Nymburk
ZEM, a.s. Lužec nad Cidlinou	8,6	590	Hradec Králové
AGRO KLUKY s.r.o.	8,2	51	Kutná Hora**
AGRO KLUKY s.r.o.	7,0	83	Kutná Hora***
Zemědělská společnost Stránka, spol. s r.o.	8,1	29	Mělník
Reprogen, a.s.	8,2	10	Tabor
Zemědělská společnost Slovec, a.s.	8,3	55	Nymburk
Statek Kodylinov, s.r.o.	7,8	80	Hradec Králové
Ing. Václav Srb	7,5	65	Praha - západ

** po repce; *** po pšenici

www.lgseeds.cz

Slechteer uw succes

Limagrain

(Dokončení ze str. 28)

Aplikační informace

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Maximální počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Bob	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	2x, moření 1x	7 dnů
Brambor	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	3x, moření 1x	7 dnů
Chmel	350–1 000 l/ha	postřik, rosení	5x	7 dnů
Cukrovka	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	3x, moření 1x	7 dnů
Hrách	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	5x, moření 1x	7 dnů
Jádroviny	150–250 l/ha	postřik, rosení	5x	7 dnů
Jahodník	150–250 l/ha	postřik	3x	7 dnů
Kukuřice	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	2x, moření 1x	7 dnů
Mák setý	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	2x, moření 1x	7 dnů
Obilniny	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	3x, moření 1x	7 dnů
Peckoviny	150–350 l/ha	postřik, rosení	5x	7 dnů
Réva	150–350 l/ha	postřik, rosení	5x	7 dnů
Růže	150–250 l/ha	postřik, rosení	5x	7 dnů
Řepka olejka	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	3x, moření 1x	7 dnů
Slunečnice	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	2x, moření 1x	7 dnů
Sója	150–250 l/ha, moření 10–15 l/t	postřik, moření	2x, moření 1x	7 dnů
Zelenina	150–250 l/ha, moření 1–2 l/kg	postřik, moření	3x, moření 1x	7 dnů
Zelenina košťálová	150–250 l/ha	postřik	3x	7 dnů

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Beloukha (kyselina pelargonová 680 g/l), platnost do 31. 8. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Chmel	hubení nadbytečných výhonů	16 l/ha, 900–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 33–87 max. 2x rok, interval mezi aplikacemi 1–16 týdnů

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Roundup Rapid (glyfosát 450 g/l), platnost do 15. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Broskvoň	pýr plazivý, mléč, pcháč	2,5–4 l/ha, 100–200 l vody/ha	AT	max. 2x za rok
Broskvoň	svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá	6 l/ha, 100–200 l vody/ha	AT	max. 2x za rok
Broskvoň	turanka kanadská	1,5 l/ha, 100–200 l vody/ha	AT	max. 2x za rok
Vojtěška množitelé porosty	kokotice v ohniscích	3,5–5 l/ha, 300–600 l vody/ha	AT	² nejpozději na počátku kvetení kokotice ³ bodová aplikace max. 2x za rok

Poznámka: ¹ke škodlivému organismu, ²k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Aplikační dávka 6 l; 5,5 l; 5 l a 4 l přípravku na hektar	5	5	0	0
Aplikační dávka 3,5 l; 3 l a 2,5 l přípravku na hektar	5	0	0	0

Vivando (metrafenon 500 g/l), platnost do 30. 4. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Chmel	padlí chmele	0,3–0,66 l/ha, 800–3 300 l vody/ha	3	¹ BBCH 32–81 max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–12 dnů

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Chmel	14	9	6	6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Chmel	5	0	0	0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

EDN (ethandinitril 970 g/kg), platnost od 29. 6. 2020 do 26. 10. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Smrk ztepilý (vytěžené kmeny)	lýkožrout smrkový, lýkožrout severský	50 g/m ³	–	¹ sklady dřeva, skládky dřeva v lese fumigace

Poznámka: ¹k umístění

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová

Pšenice ozimá

okres Příbram

* ZD v Pňovicích

výnos 7,70 - 9,30 t/ha (Ø podniku 8,20 t/ha)

okres Prostějov

* průměrný výnos pšenic podle OAK a ZETASPOL s.r.o.

plocha 9 761,01 ha = výnos 7,45 t/ha

* Julie - nejpěstovanější a nejvýnosnější „elita“

plocha 886,96 ha = výnos 7,82 t/ha

okres Uherské Hradiště

* Ostrožsko, a. s.

plocha 61,0 ha = výnos 8,60 t/ha

okres Blansko

* ZEAS Lysice, a. s.

plocha 99,0 ha = výnos 7,50 t/ha

okres Praha východ

* FYTON spol. s r. o. Nedvězí

plocha 130,0 ha = výnos 9,50 t/ha

objemová hmotnost 785 g, 13,2 % N-látek

Julie

Pšenice bez kompromisů

- * Nejprodávanejší elitní pšenice v ČR
- * Vynikající výnosy ve všech oblastech
- * Stabilní pekařská jakost

selgen®

Stupice 24, 250 84 Sibraň • tel.: 702 251 092 • e-mail: selgen@selgen.cz • www.selgen.cz