

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití a přípravky pro minoritní použití za období 1. 7. až 31. 7. 2020. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Cadou (flufenacet 508,8 g/l), Bayer AG, Německo, platnost do 31. 10. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozima pšenice, ozimý ječmen, ozimé žito, tritikale	chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní	0,3–0,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ preemergentně na podzim, BBCH 00–09 max. 1x v plodině
Ozima pšenice, ozimý ječmen, ozimé žito, tritikale	chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní	0,24–0,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ postemergentně na podzim, BBCH 10–13 max. 1x v plodině

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ozima obilniny	4	4	4	4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Pilot Ultra (chizalofop-p-ethyl 50 g/l), NISSAN CHEMICAL EUROPE SAS, Francie, platnost do 30. 11. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Řepka olejka	plevele jednoleté, plevle jednoleté, plevle jednoleté vytrvalé	2,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	90	¹ BBCH 10–39 ² BBCH 12–29 max. 1x v plodině
Brambor	plevele jednoleté, plevle jednoleté, plevle jednoleté vytrvalé	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	45	¹ BBCH 10–39 ² BBCH 12–29 není určen pro sadbové brambory max. 1x v plodině
Hrách	plevele jednoleté, plevle jednoleté, plevle jednoleté vytrvalé	2,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 10–39 ² BBCH 12–29 ³ na zrno max. 1x v plodině
Bob	plevele jednoleté, plevle jednoleté, plevle jednoleté vytrvalé	2,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	42	¹ BBCH 10–39 ² BBCH 12–29 ³ na zrno max. 1x v plodině
Cukrovka	plevele jednoleté, plevle jednoleté, plevle jednoleté vytrvalé	2,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	60	¹ BBCH 11–39 ² BBCH 12–29 ³ OL platí i pro zkrmování max. 1x v plodině

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k ochranné lhůtě, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Řepka olejka, cukrovka, bob obecný, hrách	5	5	0	0
Brambor	5	0	0	0

Revcare (mefentriflukonazol 100 g/l, pyraklostrobin 100 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 31. 1. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice	braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Ječmen	hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporióva skvrnitost ječmene, ramulariíová skvrnitost ječmene	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Žito	rychosporiíová skvrnitost, rez žitná	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Tritikale	braničnatky, rez pšeničná	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Oves	padlí travní	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves	6	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <6 m.

Revstar XL (mefentriflukonazol 100 g/l, fluxapyroxad 50 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 31. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice	braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Ječmen	hnědá skvrnitost ječmene, ramulariíová skvrnitost ječmene, rynchosporiíová skvrnitost ječmene, rez ječná	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Tritikale	braničnatky, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Žito	rychosporiíová skvrnitost, rez žitná	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Oves	rez ovesná, padlí travní	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves	4	4	4	4

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Rozhodnutí nebyla vydána.

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Envision (glyfosát 450 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 15. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Orná půda, strniště	pýr plazivý, plevle lipnicovité vytrvalé	2,4–3,2 l/ha, 80–250 l vody/ha 4 l/ha	AT	¹ po sklizni max. 1x za rok
Jádroviny, peckoviny kromě broskvoně	plevele vytrvalé	200–400 l vody/ha	AT	¹ po sklizni max. 1x za rok
Louky a pastviny	obnova TTP	2,4–4,8 l/ha, 150–250 l vody/ha	21	¹ před setím max. 1x za rok
Nezemědělská půda	nežádoucí vegetace	1,2–4,8 l/ha, 80–250 l vody/ha	AT	max. 1x za rok

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Aplikační dávka 4,8 l přípravku/ha	5	5	0	0
Aplikační dávka 4 a 3,2 l přípravku/ha	5	0	0	0

Gallup Super 360 + další obchodní jména Barbarian Super 360, Tartan Super 360 (glyfosát 360 g/l), Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Irsko, platnost do 15. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór	plevele jednoleté, výdrol obilnin	1,5 l/ha, 80–125 l vody/ha	AT	¹ preemergentně max. 1x
Chřest	plevele	1,5–4 l/ha, 80–250 l vody/ha	AT	¹ preemergentně max. 1x
Zemědělská půda – všechny plodiny	plevele	1,5–4 l/ha, 80–250 l vody/ha	AT	¹ před setím, před výsadbou max. 1x
Zemědělská půda – všechny plodiny	zrušení porostu, plevle	1,5–4 l/ha, 80–250 l vody/ha	AT	max. 1x
Zemědělská půda dočasně neobdělávaná	plevele	1,5–4 l/ha, 80–250 l vody/ha	AT	max. 1x
Nezemědělská půda kromě oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel	plevele	4 l/ha, 80–250 l vody/ha	AT	max. 1x
Půda sousedící s vodními plochami	plevele	4 l/ha, 80–250 l vody/ha	AT	max. 1x
Orná půda, strniště	plevele	1,5–4 l/ha, 80–250 l vody/ha	AT	³ nejpozději 2 dny před setím nebo sazením max. 1x
Louky a pastviny	obnova TTP	3–4 l/ha, 200–250 l vody/ha	AT	³ nejpozději 5 dnů před setím max. 1x
Lesní hospodářství	plevele	3–4 l/ha, 80–250 l vody/ha	AT	¹ po výsadbě max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²k ochranné lhůtě, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Polyversum + další obchodní jméno Polyversum – Biogarden (Pythium oligandrum M1 1 milion ks oospor/g), BIOPREPARÁTY, spol. s r. o., Praha, platnost do 30. 4. 2021

Rozsah povoleného použití

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Řepka olejka	fomová hniloba, hlízenka obecná	0,1 kg/ha, 300–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–19 na podzim, BBCH 30–65 na jaře max. 3x, interval mezi aplikacemi 14 dní
Pšenice	fuzariózy klasů	0,1 kg/ha, 300–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 13–15 na podzim, BBCH 25–65 na jaře max. 3x, interval mezi aplikacemi 14 dní
Jarní ječmen	fuzariózy klasů	0,1 kg/ha, 300–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 25–65 max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dní
Réva	plíseň šedá	0,1–0,3 kg/ha, 500–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 68–89 max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 5–8 dní
Jahodník	plíseň šedá	0,1–0,3 kg/ha, 500–1 200 l vody/ha	AT	¹ BBCH 60–89 ² skleníky max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 5–8 dní
Zelenina listová, byliny	plíseň šedá, sklerotiniíová hniloba	0,1–0,3 kg/ha, 500–1 200 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–51 ² skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 5–8 dní
Rajče, paprika, lilek	plíseň šedá, sklerotiniíová hniloba	0,1–0,3 kg/ha, 500–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–88 ² skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 5–8 dní
Okurka, cuketa	plíseň šedá, sklerotiniíová hniloba, padlí dýňovitých	0,1–0,3 kg/ha, 500–1 500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–88 ² skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 5–8 dní

(Pokračování na str. 23)

(Dokončení ze str. 22)
Rozsah povoleného použití (dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Chřest, artyčok	plíseň šedá	0,1–0,3 kg/ha, 500–1 200 l vody/ha	AT	¹ BBCH 33–53 ² skleníky max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 7–8 dní
Fazole	plíseň šedá, sklerotiniová hniloba	0,1–0,3 kg/ha, 500–1 200 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–89 ² skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 7–8 dní
Okrasné rostliny	plíseň šedá	0,1–0,3 kg/ha, 500–1 500 l vody/ha	AT	² skleníky max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 6–10 dní

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Rozsah rozšířeného použití podle čl. 51 nařízení: menšinové použití přípravku povolené podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Cukrovka, řepa krmná	spála řepná	5 g/kg osiva	AT	⁴ moření suché, obalování
Brambor – sadba	kořenomorka bramborová	0,25–0,5 kg/t sadby	AT	⁴ moření suché
Brambor – sadba	kořenomorka bramborová	0,25–0,5 kg/t sadby	AT	⁴ moření suché
Brambor – sadba	plíseň bramborová – primární infekce	0,25–0,5 kg/t sadby	AT	⁵ v systémech ekologického zemědělství
Brambor – sadba	plíseň bramborová – primární infekce	0,25–0,5 kg/t sadby	AT	⁴ nástřik na hlízy ⁵ v systémech ekologického zemědělství
Brambor	plíseň bramborová	100–200 g/ha, 300–800 l vody/ha	AT	¹ od BBCH 14 ² preventivně ⁴ postřik ⁵ v systémech ekologického zemědělství max. 8x, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Hrách	houbové choroby	0,5–1 kg/t osiva	AT	⁴ moření suché, obalování ¹ BBCH 65–79
Hrách	antraknóza hrachu	100 g/ha, 300–400 l vody/ha	AT	max. 2x, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Lupina, sója	houbové choroby	0,5–1 kg/t	AT	⁴ moření mokré, moření suché ⁴ postřik
Lupina, sója	antraknóza, sklerotiniová hniloba	100 g/ha, 300–400 l vody/ha	AT	max. 2x, interval mezi aplikacemi 7–30 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k dávkování, ⁴k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

4. Rozšířené použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána.
inzerce

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravky platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Alginure (fosfonáty draselné 342 g/l), platnost do 30. 9. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Chmel	plíseň chmele	8 l/ha, 1 400–3 000 l vody/ha	7	¹ BBCH 55–88 max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti štanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů (m)	6	6	6	6

Lepinox Plus (Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki 32 000 IU/mg), platnost do 30. 4. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Okrasné rostliny	předivky, obaleči, píďalky, bekyně, bourovci, přástevník americký, bělásek ovocný, zavíječ zimostrázový	1 kg/ha, 400–1 000 l vody/ha	–	² od začátku výskytu do 2. vývojového stadia larvy ³ chráněné prostory max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Okrasné rostliny, okrasné dřeviny	předivky, obaleči, píďalky, bekyně, bourovci, přástevník americký, bělásek ovocný, zavíječ zimostrázový	1 kg/ha, 400–1 000 l vody/ha	–	² od začátku výskytu do 2. vývojového stadia larvy ³ venkovní prostory max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Drobné ovoce	obaleči, píďalky, housenky škodlivých motýlů	1 kg/ha, 400–600 l vody/ha	AT	² od začátku výskytu do 2. vývojového stadia larvy max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Peckoviny	obaleči, píďalky	1 kg/ha, 400–600 l vody/ha	–	² od začátku výskytu do 2. vývojového stadia larvy max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Zelenina	blýskavka červivcová, černopáska bavlníková, makadlovka Tuta absoluta, západníček polní	1 kg/ha, 400–1 200 l vody/ha	AT	⁴ na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stadia larvy ³ skleníky, fóliovníky max. 12x za rok (4x na jednu generaci škůdce), interval mezi aplikacemi 4–10 dnů

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu nebylo třeba stanovit

(Dokončení přehledu najdete v některém dalším čísle týdeníku Zemědělec)

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová

Příbram

- AGROSPOL VOD Bubovice**
výnos 9,30 t/ha
- ZD v Pňovicích**
výnos 8,80 t/ha

Havlíčkův Brod

- AGROPRODUKT plus, a. s. Světlá n. Sázavou**
výnos 8,00 t/ha

Strakonice

- ZD Novosedly**
plocha 150,0 ha = výnos 8,00 t/ha

Mladá Boleslav

- Rolnické družstvo Bezno**
poloprovozní pokus = výnos 10,30 t/ha

Vanessa „C“

nakupována na oplátky

- * stabilní výnosy
- * doporučená odrůda SDO

Turandot „A“

specialista na pozdní setí

- * vysoká mrazuvzdornost
- * odolná k fuzáriím

Stupice 24, 250 84 Sibřina • tel.: 702 251 092 • e-mail: selgen@selgen.cz • www.selgen.cz

selgen®