

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 8. až 31. 8. 2020. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Mateno Duo (aklonifen 500 g/l, diflufenikan 100 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice, ozimé tritikale	plevele dvouděložné jednoleté	0,7 l/ha, 150–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–09 ² preemergentně max. 1x
Ozimá pšenice, ozimé tritikale	plevele dvouděložné jednoleté	0,7 l/ha, 150–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–13 ² BBCH 10–11 max. 1x
Ozimý ječmen, ozimé žito	plevele dvouděložné jednoleté	0,35 l/ha, 150–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–09 ² preemergentně max. 1x
Ozimý ječmen, ozimé žito	plevele dvouděložné jednoleté	0,35 l/ha, 150–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–13 ² BBCH 10–11 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimý ječmen, ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimé žito	8	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Ozimý ječmen, ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimé žito	5	0	0	0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <8 m.

inzerce

Adaptabilní kukuřice

Podesychání a rychlé nárůsty sušiny silážních kukuřic jako důsledek suchého a teplého počasí posledních let byly ve sklizni 2020 v řadě oblastí vystřídaný pomalým dozráváním a nízkými obsahy škrobu. Prodloužení vegetace bylo způsobeno jednak odlišnými podmínkami počasí, jednak změnou přístupu k ranosti hybridů na základě zkušeností z předchozích velmi teplých a suchých let, kdy někteří pěstitelé rozdělili riziko ranosti a na své plochy částečně zvolili také pozdnější hybridy, než bylo v jejich oblasti zvykem.

Tento pragmatický přístup se v letošní sezóně nemusel z hlediska zranění vyplatit. Rozložení pěstelských rizik je každoroční otázkou při volbě vhodné odrůdy. Ze sortimentu kukuřic SAATEN-UNION si může každý pěstitel vybrat vhodný hybrid, který za sucha nepodeschne a za mokra dozraje.

Korynt

Doménou hybridu Korynt S230/Z240 jsou středně vysoké až vysoké rostliny s velmi dobrým olístěním a se silnými špičkově dozrávajícími palicemi. Vynikající vyrovnanost rostlin a palic v porostu jsou každoroční zárukou produkce vysoce kvalitní siláže s velmi vysokým podílem zrna. To vše doplněno o velmi silný stay green (9,0), který udrží sklizňové okno také v suchých ročních. Korynt také dosahuje vynikajících výnosů suchého zrna a pěstitele podrží výnosem a kvalitou v mokřích i suchých letech.

Neutrino

Neutrino S240/Z240 je hybridem, který o svých kvalitách silážní kukuřice přesvědčuje také v Německu. Neutrino je především výnos. V rámci registračního řízení BSA dosáhlo nejvyššího hodnocení ve výnosu suché hmoty. Navzdory velmi vzrůstným rostlinám s bohatým olístěním není siláž z Neutrino nízké kvality. Obsahy škrobu v siláži jsou řadě zelenou hmotou na střední úrovni, stravitelnost organické hmoty siláže je středně vysoká. Neutrino je špičkovým



Korynt je unikátním hybridem kombinujícím špičkový výnos zrna, vysoký výnos hmoty, výbornou kvalitu siláže a suchovzdornost

Foto archiv firmy

silážním hybridem, ideálním z hlediska top výnosů hmoty a její kvality pro krmné účely a bioplynové stanice. Pokud máte jednu silážní jámu pro krmné účely i BPS, pak Neutrino je správnou volbou.

Sucorn

Sucorn S280/Z280 DS1710C je unikátní kombinací vzrůstných rostlin s bujným olístěním v kombinaci s mohutnou a silnou palicí. Díky těmto vlastnostem Sucorn DS1710C vytváří kompaktní až neprostupné porosty. Díky špičkovým výnosům zrna je siláž Sucorn DS1710C vysoké kvality. Z hlediska pro-

dukčního využití je Sucorn DS1710C univerzálním hybridem pro produkci siláže pro krmné účely, výrobu bioplynu a také suchého zrna. Vynikajících výsledků dosahuje při produkci vlhkého zrna. Navíc je Sucorn DS1901C vybaven stay greenem (8,0) pro dlouhé sklizňové okno v suchých ročních. Po letech se na trhu objevuje hybrid, který svými vlastnostmi dokáže nahradit fenomenální Susann.

Novialis

Novialis S300/Z300 DS1901C je novinkou roku 2021, která navazuje na úspěšný hybrid Sunset DS1469C. Je však olístěnější a výnosnější hybrid se stay green efektem. Jedná se tak o moderní hybrid, který byl selektován v průběhu posledních, co se týče počasí, velmi variabilních let. V rámci registračního řízení BSA Německo Novialis DS1901C dosáhl top výnosu hmoty (9,0). Díky kombinaci velmi vysokého objemu snadno stravitelné listové hmoty a vysokého podílu zrna v řezance dosahuje stravitelnost siláže vysoké úrovně. Novialis DS1901C své uplatnění nachází na farmách s tržní produkcí mléka, ale lze jej s úspěchem sklídit také na zrna. Svým habitem a agronomickými vlastnostmi je velmi podobný hybridu Sucorn v pozdnější verzi. Novialis DS1901C lze s úspěchem sklídit také na zrna.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.
product manager kukuřice
SAATEN-UNION CZ s. r. o.

Monex (kyselina 1-naftyloctová 10 g/kg), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 31. 12. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jabloň	redukce nadměrné násady plodů	1,5 kg/ha, 1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 69–72 max. 1x za rok
Jabloň	zabránění opadu plodů	1,5 kg/ha, 1 000 l vody/ha	7	¹ BBCH 71–87 max. 1x za rok

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Pictor Active (boscalid 150 g/l, pyraklostrobin 250 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 31. 12. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Řepka olejka	hlízenka obecná, alternariová skvrnitost, fomové černání stonků řepky, plíseň zelná, plíseň šedá	0,6–1 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 51–75 max. 1x ² BBCH 40–75 max. 2x, interval mezi aplikacemi 21 dnů
Slunečnice	hlízenka obecná, alternariová skvrnitost, fomová hniloba slunečnice	0,7–1 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 51–75 max. 1x
Sója luštěnatá	hlízenka obecná, spála lusků a stonků sóji	1 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 51–75 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Řepka, slunečnice	12	6	4	4
Sója	12	5	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <12 m.

Pride (prothiokonazol 250 g/l), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 31. 7. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jarní ječmen	rez ječná, padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–59 max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dní
Pšenice	fuzariózy klasů	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 61–65 max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dní
Pšenice	braničnatka plevová	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–59 max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dní
Ozimá pšenice, tritikale, žito	stéblolam	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 25–31 max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dní

(Pokračování na str. 26)

inzerce

VÝNOS, KVALITA A SPOLEHLIVOST

KUKUŘICE SETA

KORYNT S 230 Z 240 Machr na siláž a zrna.



NEUTRINO S 240 Z 240 Výnos především.



SUCORN S 280 Z 280 DS1710C Unikátní na první pohled.



NOVIALIS S 300 Z 300 DS1901C Siláž na maximum.



Kvalitní certifikované osivo k dostání u všech významných osivářských firem v ČR.

SAATEN-UNION CZ s.r.o.
tel.: 541 22 11 75
www.saaten-union.cz

SAATEN-UNION
Züchtung ist Zukunft

Přehled nových ...

(Pokračování ze str. 25)

Pride (prothiokonazol 250 g/l), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 31. 7. 2021 (dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice, tritikale, žito	padlí travní, braničnatka pšeničná	0,8 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–59 max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dní
Řepka olejka	hlízenka obecná	0,7 l/ha, 200–400 l vody/ha	56	¹ BBCH 61–69 max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dní

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Řepka olejka, pšenice, jarní ječmen, tritikale, žito	4	4		4

Řepka olejka: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pšenice, jarní ječmen, tritikale, žito: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Prothiokonazole 250 EC (prothiokonazol 250 g/l), Finchimica S. p. a., Itálie, platnost do 31. 7. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice, žito, tritikale	stéblová	0,8 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	¹ na jaře, BBCH 25–32 ⁴ max. 1x na jaře
Pšenice, žito, tritikale	braničnatka pšeničná	0,8 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	⁴ max. 3x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů ¹ BBCH 30–61
Pšenice, žito	braničnatka plevová	0,8 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	⁴ max. 3x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů ¹ BBCH 30–61
Pšenice, žito, tritikale	padlí travní	0,8 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	⁴ max. 1x ¹ BBCH 30–61
Jarní ječmen	padlí travní	0,8 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	⁴ max. 1x ¹ BBCH 30–61
Pšenice, žito, tritikale	rez pšeničná, rez plevová	0,8 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	⁴ max. 3x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů ¹ BBCH 30–61
Jarní ječmen	rez ječná	0,8 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	⁴ max. 2x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů ¹ BBCH 59–69
Pšenice	fuzariózy klasů	0,8 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	⁴ max. 1x ¹ BBCH 30–61
Jarní ječmen	hnědá skvrnitost ječmene	0,8 l/ha, 100–400 l vody/ha	35	⁴ max. 1x ¹ BBCH 53–59
Řepka olejka	hlízenka obecná	0,7 l/ha, 100–400 l vody/ha	56	⁴ max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ⁴k dávkování, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Řepka olejka, pšenice, jarní ječmen, tritikale, žito	4	4	4	4

Řepka olejka, jarní ječmen: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pšenice, tritikale, žito: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Revytrex (mefentriflukonazol 66,7 g/l, fluxapyroxad 66,7 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 31. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice	braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Ječmen	hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene	1,5 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Žito	rynychosporiová skvrnitost, rez žitná	1,125 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Tritikale	braničnatky, rez pšeničná	1,125 l/ha, 100–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–69 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, ječmen, žito, tritikale	4	4	4	4

RiNiDi WG (dikamba 550 g/kg/ve formě sodné soli 604,7 g/kg, nikosulfuron 92 g/kg, rimsulfuron 23 g/kg), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	plevele dvouděložné jednoleté	440 g/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 14–18 ² postemergentně max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Kukuřice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Kukuřice	5	5	5	0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Shyfo (glyfosát 360 g/l), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 15. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Orná půda – strišně, půda dočasně neobdělávaná	plevele jednoleté	1,5–3 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	max. 1x
Orná půda – strišně, půda dočasně neobdělávaná	pýr plazivý	2–3 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	max. 1x
Lesní hospodářství – výsadby jehličnatých a listnatých stromů, lesní školky	plevele jednoděložné	1,5–2 l/ha, 100–400 l vody/ha	–	max. 1x
Lesní hospodářství – výsadby jehličnatých a listnatých stromů, lesní školky	dřeviny plevelné	3 l/ha, 100–400 l vody/ha	–	max. 1x
Okrasné rostliny	plevele jednoleté	1,5 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	max. 1x

Poznámka: AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Aplikační dávka 3 l přípravku/ha	10	5	5	0
Aplikační dávka 1,5 a 2 l přípravku/ha	5	5	0	0

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Adigor (olej řepkový – methylester 440 g/l), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 10. 8. 2030

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
TM s povolenými přípravky	zlepšení vlastností aplikační kapaliny	1–1,5 l/ha	–	–

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Amistar Gold (azoxystrobin 125 g/l, difenokonazol 125 g/l), Syngenta Limited, Velká Británie, platnost do 31. 12. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá řepka	fomová hniloba	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 14–55 ⁴ 1x na podzim, 1x na jaře
Ozimá řepka	hlízenka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 59–69 max. 2x
Jarní řepka	hlízenka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 59–69 max. 1x
Jarní řepka	fomová hniloba	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–55 max. 1x
Slunečnice	fomová hniloba, hlízenka obecná, červenohnědá skvrnitost slunečnice	1 l/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 20–55
Cukrovka	cerkosporióza řepy, rez řepná, padlí řepné, větevnatka řepná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 39–49 max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 4)k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimá řepka, jarní řepka, slunečnice, cukrovka	4	4	4	4

Pro aplikaci do ozimé řepky: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pro aplikaci do slunečnice, cukrovky: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Roundup Klasik Pro (glyfosát 360 g/l), Bayer AG, Německo, platnost do 15. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jádroviny, peckoviny kromě broskvoně, réva	pýr plazivý, pcháč, mléč	3–5 l/ha, 200 l vody/ha max.	AT, 14	³ OL 14 pro révu vinnou, OL AT pro jádroviny, peckoviny kromě broskvoně ⁴ max. 2x za rok
Jádroviny, peckoviny kromě broskvoně, réva	svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá	7,5 l/ha, 200 l vody/ha max.	AT, 14	³ OL 14 pro révu vinnou, OL AT pro jádroviny, peckoviny kromě broskvoně ⁴ max. 1x za rok
Jádroviny, peckoviny kromě broskvoně, réva	turanka kanadská	2 l/ha, 200 l vody/ha max.	AT, 14	³ OL 14 pro révu vinnou, OL AT pro jádroviny, peckoviny kromě broskvoně ⁴ max. 2x za rok
Sady ovocné, aleje, jiné porosty	likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti	5 %	AT	
Orná půda	plevele jednoleté	2–3 l/ha, 100–150 l vody/ha	AT	¹ před setím, před výsadbou ⁴ max. 1x za rok
Orná půda	pýr plazivý, plevle vytrvalé	3–5 l/ha, 100–150 l vody/ha	AT	¹ před setím, před výsadbou ⁴ max. 1x za rok
Orná půda	plevele jednoleté	2–3 l/ha, 200 l vody/ha max.	AT	¹ po sklizni ⁴ max. 1x za rok
Orná půda	pýr plazivý, plevle vytrvalé	3–5 l/ha, 200 l vody/ha max.	AT	¹ po sklizni ⁴ max. 1x za rok
Jahodník	plevele přerostlé	1–2 l/ha (33–50 % roztok)	AT	
Louky, pastviny	obnova TTP	3–6 l/ha, 200 l vody/ha max.	21	
Zavlažovací kanály	plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny	5 l/ha, 200–300 l vody/ha	–	
Železnice	nežádoucí vegetace	5–8 l/ha, 300 l vody/ha max.	–	
Nezemědělská půda	nežádoucí vegetace	3–6 l/ha, 300 l vody/ha max.	–	⁴ max. 2x za rok
Nezemědělská půda	bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevle – expandující druhy	7–8 l/ha, 300–400 l vody/ha	–	⁴ aplikace plošná max. 1x za rok
Nezemědělská půda	bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevle – expandující druhy	4 %	–	⁴ bodová aplikace max. 1x
Lesní hospodářství – chemická příprava pro obnovu lesa	plevele, nežádoucí dřeviny	3–7 l/ha, 200 l vody/ha	–	⁴ max. 1x za rok
Lesní hospodářství – lesní porosty	plevele, nežádoucí dřeviny	3–7 l/ha, 200 l vody/ha	–	⁴ max. 2x za rok
Lesní hospodářství – lesní školky	buřň	3–5 l/ha, 200 l vody/ha	–	⁴ max. 1x za rok
Lesní hospodářství – prořezávky a probírky	hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti	15 % nátěr, 5 % postřik	–	⁴ nátěr, postřik, max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²k ochranné lhůtě, ³k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Aplikační podmínky pro Roundup Klasik Pro

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Maximální počet aplikací v plodině
Sady ovocné, aleje a jiné porosty		nátěr, postřik	1x
Jádroviny, peckoviny (kromě broskvoně), réva	max. 200 l/ha	postřik	2x za rok
Jahodník		aplikace knotovým rámem	1x za rok
Lesní hospodářství	200 l/ha	postřik	2x za rok
Louky, pastviny	max. 200 l/ha	postřik	1x za rok
Nezemědělská půda	300–400 l/ha	postřik	2x za rok
Orná půda	max. 200 l/ha	postřik	2x za rok
Zavlažovací kanály	200–300 l/ha	postřik	1x za rok
Železnice	max. 200 l/ha	postřik	1x za rok

(Pokračování na str. 27)

(Dokončení ze str. 26)

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Apl. dávka 8 l/ha, 7,5 l/ha, 7 l, 6 l/ha a 5 l/ha	5	5	0	0
Apl. dávka 4 l/ha a 3 l/ha	5	0	0	0

Nepropustné povrchy: za účelem ochrany vodních organismů lze přípravek aplikovat maximálně na 50 % celkové ošetřované plochy.

Touchdown Quattro (glyfosát 360 g/l), Syngenta Limited, Velká Británie, platnost do 15. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Přikopy bez vodních toků	bolševník velkolepý	5 l/ha	–	^a aplikace plošná
Přikopy bez vodních toků	bolševník velkolepý	5–10 %	–	^a aplikace cílená – postřik
Cukrovka	plevele	3 l/ha	AT	¹ před setím, před vzejitím
Lesní školky – cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukční plochy	plevele jednoleté	2–3 l/ha, 100–200 l vody/ha	–	
Lesní školky – cesty mezi záhony, komposty, mimoprodukční plochy	plevele vytrvalé	3–5 l/ha, 100–200 l vody/ha	–	
Lesní školky – sazenice, lesní školky – semenáče	plevele jednoleté	2–3 l/ha, 100–300 l vody/ha	–	^a aplikace s kryty
Lesní školky – sazenice, lesní školky – semenáče	plevele vytrvalé	3–4 l/ha, 100–300 l vody/ha	–	^a aplikace s kryty
Louky, pastviny	obnova TTP	4–5 l/ha	14	
Nezemědělská půda	nežádoucí vegetace	4–5 l/ha, 100–200 l vody/ha nebo 40–50 ml/100 m ² , 1–2 l vody/100 m ²	–	
Réva, sady ovocné kromě broskvoně	mléč, pcháč, pýr plazivý, sylačec rolní	3–6 l/ha	7	
Réva, sady ovocné kromě broskvoně	plevele jednoleté, turanka kanadská	2 l/ha	7	
Orná půda, stříště	pýr plazivý	3–4 l/ha, 200 l vody/ha max.	AT	
Orná půda, stříště	plevele vytrvalé	4 l/ha, 200 l vody/ha max.	AT	
Orná půda	plevele jednoleté	2–3 l/ha, 100–200 l vody/ha	AT	¹ před výsevem, před výsadbou
Orná půda	plevele vytrvalé	3–4 l/ha, 100–200 l vody/ha	AT	¹ před výsevem, před výsadbou
Borovice, smrk	plevele jednoleté	2–3 l/ha	–	^a aplikace s kryty
Borovice, smrk	plevele vytrvalé	3–5 l/ha	–	^a aplikace s kryty
Lesní hospodářství – přirozená obnova pod výběrovými stromy	plevele jednoleté	3 l/ha	–	¹ před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků
Lesní hospodářství – přirozená obnova pod výběrovými stromy	plevele vytrvalé	3–4 l/ha	–	¹ před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků

Poznámka: ¹k plodině, ^ak dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Aplikační podmínky pro Touchdown Quattro

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Maximální počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Borovice, smrk, lesní hospodářství lesní školky	100–300 l/ha	postřik	1x	–
Louky, pastviny, přikopy, orná půda, cukrovka	100–200 l/ha	postřik	1x	–
Přikopy		cílená aplikace (postřikem)	1x	–
Nezemědělská půda	100–200 l/ha, 1–2 l/100 m ²	postřik	1x	–
Réva, sady ovocné, stříště	200 l/ha max.	postřik	1x	–

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Apl. dávka 6 l př./ha a 5 l př./ha	5	5	0	0
Apl. dávka 4 l př./ha a 3 l př./ha	5	0	0	0

4. Rozšířené použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána.

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

NeemAzal-T/S (azadirachtin 10,6 g/l), platnost do 31. 5. 2021

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jilm	bělokaz jilmový	10–30 ml/1 l vody	–	¹ BBCH 20–99, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období kromě období květu
Lipa	zdobnatka lipová	10–30 ml/1 l vody	–	¹ BBCH 20–99, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období kromě období květu
Smrk	korovnice smrková	10–30 ml/1 l vody	–	¹ BBCH 20–99, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období kromě období květu
Stromy listnaté opadavé	korovnice smrková	10–30 ml/1 l vody	–	¹ BBCH 20–99, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období kromě období květu
Bez černý	savý hmyz, žravý hmyz	3 l/ha	7	² při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3
Jádroviny kromě hrušeně	savý hmyz, žravý hmyz, minující škůdci	4,5 l/ha (1,5 l/1 m výšky koruny/ha)	14	¹ BBCH 70–80
Meruňka, třešeň, broskvoň, slivoň	mšice, píďalky	3 l/ha (1 l/1 m výšky koruny/ha)	7	² při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L2
Chřest	savý hmyz, žravý hmyz	3 l/ha	AT	¹ po sklizni
Jahodník	obaleči, píďalky, housenky škodlivých motýlů	3 l/ha	3	² při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3

NeemAzal-T/S (azadirachtin 10,6 g/l), platnost do 31. 5. 2021 (dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brusnice brusinka, borůvka, klikva, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, růže šípková, morušovník, hloh a ostatní bobulovité a drobné ovoce	obaleči, píďalky, housenky škodlivých motýlů	3 l/ha	7	² při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Aplikační podmínky pro NeemAzal-T/S

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Maximální počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Jilm, lípa, smrk, stromy listnaté opadavé	100–1 000 ml/strom, podle velikosti stromu	injektáž	1x za rok	
Brusnice brusinka, borůvka, klikva, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, růže šípková, morušovník, hloh, bez černý a ostatní bobulovité a drobné ovoce	400–800 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7–10 dnů
Jádroviny	300–1 500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)	postřik, rosení	4x za rok	10–14 dnů
Meruňka, třešeň, broskvoň, slivoň	500–1 500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)	postřik, rosení	3x za rok	7 dnů
Chřest	300–600 l/ha	postřik, rosení	2x za rok	7 dnů
Jahodník	400–800 l/ha	postřik, rosení	3x za rok	7–10 dnů

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jádroviny kromě hrušeně, meruňky, třešně, broskve, švestky	20	14	9	6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)				
Jádroviny kromě hrušeně, meruňky, třešně, broskve, švestky	20	15	10	0
Bez černý, maliny, ostružiny, rybíz, angrešt, šípky, moruše, hloh a ostatní bobulovité a drobné ovoce kromě jahodníku, brusnice brusinky, borůvky a klikvy	5	0	0	0

Jádroviny kromě hrušeně, meruňky, třešně, broskve, švestky: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m. Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

Storonet (alfa-cypermethrin 1,57 g/kg), platnost od 24. 8. 2020 do 30. 11. 2020

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Smrk ztepilý, borovice lesní	kůrovci	podle návodu	–	³ skládka dřeva nebo napadená dřevní hmota pokrytí dřeva sítí

Poznámka: ³k umístění, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová

— Inzerce

PIONEER... TO ŽERU!

MILK POWER

P7460	FAO 220
P8201	FAO 240
P8358	FAO 260
P8888	FAO 290
P9127	FAO 310
P9415	FAO 350

CORTEVA agriscience **PIONEER**