

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití v ochraně rostlin za období 1. 7. až 31. 7. 2021. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Brando (napropamid 500 g/l, chinmerak 100 g/l), GLOBACHEM nv., Belgie, platnost do 31. 12. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá řepka	lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	1,5–2,5 l/ha, 150–400 l vody/ha	AT	¹ preemergentně, do 08 BBCH ² preemergentně max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimá řepka	12	6	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

V5 (virus mozaiky pepina mírný izolát VC1 5–25 mg/l), Valto B. V., Nizozemsko, platnost do 29. 3. 2033

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Rajče	Pepino mosaic virus na rajčeti (izolát CH2)	70 l/ha TM se syntetickým pískem 800 g/100 l jichy 3500 l vody/ha	–	¹ BBCH 13–51 (výška rostlin 10–30 cm) ⁴ postřik ⁵ skleníky max. 1x
Rajče	Pepino mosaic virus na rajčeti (izolát CH2)	0,8 l/ha TM se syntetickým pískem 15 g/1 l jichy 8 l vody/ha	–	¹ BBCH 13–61 BBCH ⁴ nátěr na list ⁵ skleníky max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Rock Effect NEW (olej z Pongamia pinnata 496,9 g/l), AGRO CS a. s., Česká Skalice, platnost do 18. 6. 2031

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Zelenina, okrasné rostliny	zvýšení odolnosti rostlin	1–2 % (10–20 l/ha) 500–1 000 l vody/ha	–	² mšice, molice, třásněnky, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu ³ venkovní prostory, chráněné prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Zelenina, okrasné rostliny	zvýšení odolnosti rostlin	0,5–1 % (5–10 l/ha) 500–1 000 l vody/ha	–	² svilušky, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu ³ venkovní prostory, chráněné prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Zelenina, okrasné rostliny	zvýšení odolnosti rostlin	1 % (10 l/ha) 500–1 000 l vody/ha	–	² padlí, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu ³ venkovní prostory, chráněné prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Okrasné rostliny	zvýšení odolnosti rostlin	2–3 % (20–30 l/ha) 500–1 000 l vody/ha	–	² červci, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu ³ venkovní prostory, chráněné prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Ovocné dřeviny, bobuloviny, réva	zvýšení odolnosti rostlin	1–2 % (10–20 l/ha) 500–1 000 l vody/ha	–	² mšice, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu ³ venkovní prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Ovocné dřeviny, bobuloviny, réva	zvýšení odolnosti rostlin	0,5–1 % (5–10 l/ha) 500–1 000 l vody/ha	–	² svilušky, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu ³ venkovní prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Ovocné dřeviny, bobuloviny, réva	zvýšení odolnosti rostlin	1 % (10 l/ha) 500–1 000 l vody/ha	–	² padlí, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu ³ venkovní prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Angrešt, rybíz	zvýšení odolnosti rostlin	1 % (10 l/ha) 500–1 000 l vody/ha	–	² americké padlí angreštové, při ohrožení porostů ³ venkovní prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Chmel	zvýšení odolnosti rostlin	1 % (20 l/ha) 500–2 000 l vody/ha	–	² plíseň chmele, při ohrožení porostů ³ venkovní prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Chmel	zvýšení odolnosti rostlin	0,5–1 % (10–20 l/ha) 500–2 000 l vody/ha	–	² svilušky, při ohrožení porostů ³ venkovní prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Chmel	zvýšení odolnosti rostlin	1–2 % (20–40 l/ha) 500–2 000 l vody/ha	–	² mšice, při ohrožení porostů ³ venkovní prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Obilniny	zvýšení odolnosti rostlin	0,5–0,75 % (4–6 l/ha) 500–800 l vody/ha	–	² mšice, při ohrožení porostů ³ venkovní prostory interval mezi aplikacemi 7–14 dnů

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Corida + další obchodní jméno Adentis, Roni 75 WG (tribenuron-methyl 750 g/kg), Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd, Bulharsko, platnost do 30. 1. 2035

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice, ječmen	plevele dvouděložné jednoleté	15–25 g/ha, 200–400 l vody/ha	30	¹ BBCH 31–39 ² do BBCH 16 – aktivně rostoucí max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimá pšenice, ozimý ječmen – kyselé půdy	5	4	4	4
Ozimá pšenice, ozimý ječmen – zásadité půdy	6	4	4	4
Jarní pšenice, jarní ječmen – kyselé půdy	7	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Ozimá pšenice, jarní pšenice, ozimý ječmen, jarní ječmen	5	0	0	0

Ozimá pšenice, ozimý ječmen – kyselé půdy: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Ozimá pšenice, ozimý ječmen – zásadité půdy: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Jarní pšenice, jarní ječmen – kyselé půdy: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Kantor (florasulam 50 g/l), Corteva Agriscience Czech s. r. o., Praha, platnost do 31. 12. 2031

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice, ozimé tritikale	plevele dvouděložné jednoleté	0,08–0,1 l/ha, 200–300 l vody/ha	60	¹ BBCH 13–32, na jaře ² BBCH 12–16 max. 1x
Ozimá pšenice, ozimý ječmen, ozimé tritikale, ozimé žito	plevele dvouděložné jednoleté	0,075 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 13–29, na podzim ² BBCH 12–16 max. 1x
Jarní pšenice, jarní ječmen, jarní oves, ozimý ječmen, ozimé žito	plevele dvouděložné jednoleté	0,1 l/ha, 200–400 l vody/ha	60	¹ BBCH 13–29, na jaře ² BBCH 12–16 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Podzimní aplikace v plodinách: Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, ozimé žito				
	4	4	4	4

Tepecki + další obchodní jméno Afinto (flonikamid 500 g/kg), ISK Biosciences Europe N. V., Belgie, platnost do 31. 8. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Chmel otáčivý	mšice chmelová	0,18 kg/ha, 1 800–3 000 l vody/ha	21	podle signalizace max. 2x za rok
Cukrovka, řepa salátová, řepa krmná	mšice broskvoňová, mšice maková	0,14 kg/ha, 200–500 l vody/ha	60	¹ BBCH 12–18 max. 1x
Ozimá řepka	mšice broskvoňová	0,10 kg/ha, 200–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 16–18 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Scab 80 WG (kaptan 800 g/kg), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 31. 7. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jádroviny	strupovitost	1,88 kg/ha, 1 000 l vody/ha	21	¹ od BBCH 51 max. 10x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Okrasné rostliny	skvrnitost listů	0,2 %, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 13–69 ³ venkovní prostory, skleníky max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 10 dnů
Rajče	plíseň rajčete	1,5–1,8 kg/ha, 150–1 000 l vody/ha	21	¹ BBCH 71–85 BBCH ⁵ pole max. 3x, interval mezi aplikacemi 10 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jádroviny	25	20	15	6
Okrasné rostliny >150 cm	18	12	6	6
Okrasné rostliny >50 cm, rajče	4	4	4	4

Jádroviny: s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 20 m vegetačního pásu.

Okrasné rostliny >150 cm: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m.

Rajče: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

4. Rozšíření použití nebo změna v použití pomocného prostředku Rozhodnutí nebyla vydána

(Dokončení přehledu najdete v některém dalším čísle týdeníku Zemědělec.)

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová