

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití za období 1. 12. až 31. 12. 2021. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Effendi 500 SC (metazachlor 500 g/l), SYNTHOS AGRO SP. Z. o. o., Polsko, platnost do 31. 7. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozímá řepka	plevele dvouděložné jednoleté	2 l/ha, 200–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–05 ² preemergentně, max. 1x
Ozímá řepka	plevele dvouděložné jednoleté	2 l/ha, 200–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 11–12 ² postemergentně, max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ozímá řepka	7	4	4	4
Ozímá řepka	5	0	0	0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Itcan SL 270 + další obchodní jméno Crown MH (malein hydrazid 270 g/l), Kreglinger Europe NV, Belgie, platnost do 31. 10. 2033

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	inhibice klíčení	11 l/ha, 300–600 l vody/ha	21	¹ BBCH 69–89 ² konzumní, max. 1x
Brambor	inhibice klíčení, zabránění porůstání brambor v následných plodinách	11 l/ha, 300–600 l vody/ha	21	¹ BBCH 69–89 max. 1x
Cibule	inhibice rašení	8,9 l/ha, 500–600 l vody/ha	4	¹ BBCH 47–48 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²k určené sklizni, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Prabha (boskalid 233 g/l, prothiokonazol 100 g/l), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 31. 7. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozímá pšenice	braničnatka pšeničná, rez pšeničná	1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–59 max. 2x v plodině, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ozímá pšenice	fuzariózy klasů pšenice	1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 39–59

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ozímá pšenice	4	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažitých se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Stromena (styren-akrylátový kopolymer 250 g/kg), Lucie Němcová, Úhřetice, platnost do 15. 11. 2031

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ovocné dřeviny, okrasné dřeviny	ochrana ran po řezu	nátěr podle velikosti rány	–	–

Pozn.: (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Belem 0,8 MG (cypermethrin 8,0 g/kg), SBM Développement S. A. S., Francie, platnost do 31. 10. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Mrkev	drátovci, pochmurnatka mrkvová	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Cukrovka	drátovci	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Křen, celer bulvový, pastinák, petržel kořenová, ředkvička, tuřín	drátovci	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Celer bulvový, pastinák, petržel kořenová	pochmurnatka mrkvová	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Zelí hlávkové, kapusta hlávková	drátovci, květlika zelná	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Rajče	drátovci, osenice	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Baklažán	drátovci, osenice	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Brambor	drátovci	24 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Cibule, cibule šalotka, česnek	drátovci	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Řepka olejka	drátovci, květlika zelná, dřepčík olejkový	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Okrasné trávníky	drátovci, osenice	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Tykev	drátovci	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Tabák	drátovci, osenice	12 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě
Kukuřice	drátovci, bázlivec kukuřičný	12–24 kg/ha	AT	aplikace do půdy při výsevu/výsadbě

Poznámka: AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ekol (olej řepkový, oxidovaný 90 %), PROXIM s. r. o., Rybitví, platnost do 10. 12. 2031

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ovocné dřeviny, okrasné dřeviny, réva	zvýšení odolnosti rostlin	30 l/ha (10 l/1 m výšky koruny/ha), 1 000–1 500 l vody/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	AT	¹ přezimující škůdci, jarní škůdci, při výskytu po vyrašení max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ovocné dřeviny, okrasné dřeviny	zvýšení odolnosti rostlin	20 l/ha, 1 000 l vody/ha	AT	² svilušky, mšice, při výskytu v průběhu vegetace max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: ¹ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Incelo (mesosulfuron-methyl 45 g/kg, thienkarbazon-methyl 15 g/kg), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 9. 8. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozímá pšenice, ozimé tritikale, ozimé žito	psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	0,2 kg/ha + 1 l/ha Biopower – TM, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 21–32 ² postemergentní max. 1x na jaře
Ozímá pšenice, ozimé tritikale	psárka polní, jilek, oves hluchý, sveřep jalový, plevle dvouděložné jednoleté	0,333 kg/ha + 1 l/ha Biopower – TM, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 21–32 ² postemergentní max. 1x na jaře

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ozímá pšenice, ozimé tritikale, ozimé žito	4	4	4	4
Ozímá pšenice, ozimé tritikale, ozimé žito	5	0	0	0

(Dokončení přehledu najdete v některém dalším čísle týdeníku Zemědělec.)

Přehled přípravků připravila **Barbora Venclová**

inzerce

2. 3.



Konference Živá krajina

Nejvýznamnější událost o regenerativním zemědělství v České republice.

Perspektivy snižování uhlíkové stopy v zemědělství. Budoucnost pro půdu, krajinu i zemědělskou produkci. Buďte u toho.

2. března 2022 9:00 – 17:00

Hotel Olšanka, Praha + živý přenos on-line

Působíte v rostlinné nebo živočišné produkci v konvenčním či ekologickém režimu? Udělejte s námi krok k ziskovému a přitom šetrnému hospodaření.

Podrobný program a registrace na www.konference-zivakrajina.cz

Carboneg
Pořádá

VČZT

VÚRV

MONETA
Hlavní partner

Zemědělec
Mediální partner

PP