

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí dokončení přehledu přípravků s rozšířeným použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 12. až 31. 12. 2021. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Jenot 100 EC + další obchodní jméno Investo 100 EC, Hornet 100 EC (chizalofop-P-ethyl 100 g/l), INNVIGO Sp. z o. o., Polsko, platnost do 30. 11. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Cukrovka	plevele jednoděložné jednoleté, výdrol obilnin	0,4–0,5 l/ha, 200–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–34 BBCH ¹ BBCH 12–29 max. 1x
Cukrovka	pýr plazivý	1–1,5 l/ha, 200–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–34 BBCH ¹ BBCH 12–29 max. 1x
Ózimá řepka	plevele jednoděložné jednoleté, výdrol obilnin – ozimá pšenice a ozimé tritikale, pýr plazivý	0,3–0,4 l/ha, 200–300 l vody/ha	90	¹ BBCH 12–21 ² postemergentně ³ max. 1x na podzim
Ozimá řepka	plevele jednoděložné jednoleté, výdrol obilnin – ozimá pšenice a ozimé tritikale, pýr plazivý	0,4–0,5 l/ha, 200–300 l vody/ha	90	¹ BBCH 30–32 ² postemergentně ³ max. 1x na jaře

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k ochranné lhůtě, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Cukrovka	5	5	0	0

Mildicut (kyazofamid 25 g/l, fosfonát disodný 250 g/l), ISK Biosciences Europe N. V., Belgie, platnost do 31. 7. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Réva	plíseň réвовá	2 l/ha, 500 l vody/ha do BBCH 61, 4 l/ha, 1 000 l vody/ha do BBCH 61	21	¹ BBCH 15–89 max. 3x za rok do celkové dávky 8 l/ha, interval mezi aplikacemi 10–14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Réva	6	6	6	6

Sercadis (fluxapyroxad 300 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 31. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Réva	padlí réвовé	0,09 l/ha do BBCH 61, 0,15 l/ha od BBCH 61, 200–1 200 l vody/ha (max. 500 l vody/ha do BBCH 61)	35	¹ BBCH 11–83 max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 10–21 dnů ¹ BBCH 53–81
Jádroviny	padlí jabloňové	0,25 l/ha, 150–1 000 l vody/ha	35	max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů ¹ BBCH 53–81
Jádroviny	strupovitost	0,25–0,3 l/ha, 150–1 000 l vody/ha	35	max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jádroviny	6	6	6	6

Temsa SC + další obchodní jméno Osorno, Triton, Logano (mesotrion 100 g/l), GLOBACHEM nv., Belgie, platnost do 31. 5. 2033

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	plevele dvouděložné jednoleté	0,75 l/ha, 100–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18; ² postemergentně max. 1x
Kukuřice	ježatka kuří noha, plevle dvouděložné jednoleté	1 l/ha, 100–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18; ² postemergentně max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Kukuřice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Kukuřice	5	5	0	0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

(Pokračování na str. 27)

Ideál pro první jarní ošetření obilnin

Fungicid Unix 75 WG je určen pro velmi časnou ochranu porostů ozimů (pšenice i ječmene) proti pravému stéblolamu, padlí travnímu a listovým chorobám. Unix 75 WG je registrován pro aplikaci od počátku sloupkování do BBCH 32, jeho použití je ale ideální právě na počátku sloupkování, a to z několika důležitých důvodů.

Důležitá prevence

Prvním je preventivní aplikace, kterou doporučuje už etiketa produktu. Při preventivní aplikaci fungicidu Unix 75 WG totiž kromě stéblolamu spolehlivě účinkuje na padlí travní a listové choroby, jako jsou braničnatka pšeničná, hnědá a rynchosporiová skvrnitost ječmene.

Efektivní při nízkých teplotách

Druhým důvodem je excelentní efektivita fungicidu Unix už při poměrně nízkých teplotách během aplikace, se kterými se v jar-

ním období setkáváme velmi často. Unix 75 WG, přesněji účinná látka cyprodinil v něm obsažená, efektivně působí na potlačení chorob už při teplotách od 5 °C, na rozdíl od azolových účinných látek, u kterých je nutná teplota potřebná pro jejich dobrou efektivitu od 8–10 °C, obdobně jako u účinné látky prochloraz, která pro spolehlivou účinnost vyžaduje teploty od 8 °C.

Spolehlivý proti stéblolamům

Dalším benefitem fungicidu Unix 75 WG je jeho spolehlivý účinek proti oběma typům stéb-



Padlí travní na ječmeni

Foto archiv firmy




Hnědá skvrnitost ječmene

Foto archiv firmy



Stéblolam

Foto archiv firmy



lolu (R-typ = žitný i W-typ = pšeničný), a také účinek na všechny patotypy stéblolamu. Tato široká účinnost je pro praxi velkou výhodou.

Možné tankmix kombinace

Unix 75 WG je kompatibilní jak s azolovými fungicidy, tak s regulátory Moddus a Moddus Flexi. Při přípravě aplikační kapaliny je potřeba dodržet standardní postup – tedy nejprve do aplikačního zařízení vložit Unix 75 WG

a po jeho úplném rozpuštění přidat další komponent tank mixu.

Jak pořídit Unix 75 WG výhodněji?

Letos nabízíme zvýhodněnou cenu fungicidu Unix 75 WG pro členy AgriClubu:

- Do 50 l – sleva 2 %.
- 51–150 l – sleva 4 %.
- 151 l a více – sleva 6 %.

Ing. Václava Spáčilová Ph.D.
Syngenta CZ

(Dokončení ze str. 26)

4. Rozšíření použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána.

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravky platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Algisure (fosfonáty draselné 342 g/l), platnost do 31. 1. 2027

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Chmel	plíseň chmele	8 l/ha, 1 400–3 000 l vody/ha	7	¹ BBCH 55–88 max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Okrasné rostliny	plíseň	4 l/ha, 300–800 l vody/ha	–	¹ od BBCH 12; ³ venkovní prostory, chráněné prostory max. 3x za rok (nad 150 cm 4x za rok), interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Ředkev, ředkvička	plíseň	4 l/ha, 300–800 l vody/ha	14	¹ BBCH 11–47; ³ venkovní prostory max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Cibule, česnek, cibule šalotka	plíseň	4 l/ha, 300–800 l vody/ha	14	¹ BBCH 11–48; ³ venkovní prostory max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Salát, špenát	plíseň	4 l/ha, 300–800 l vody/ha	10	¹ BBCH 11–47; ³ venkovní prostory, chráněné prostory max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Kapusta, zelí čínské, květák, brokolice	plíseň	4 l/ha, 300–800 l vody/ha	7	¹ BBCH 11–47; ³ venkovní prostory max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Byliny	plíseň	4 l/ha, 300–800 l vody/ha	7	¹ BBCH 14–49; ³ chráněné prostory max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Chmel, okrasné rostliny nad 150 cm	6	6	6	6

Itcan SL 270 (malein hydrazid 270 g/l), platnost do 31. 10. 2033

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Česnek	inhibice rašení	8,9 l/ha, 500–600 l vody/ha	4	¹ BBCH 47–48; max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Mospilan 20 SP (acetamiprid 200 g/kg), platnost do 30. 4. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá řepka	zápředníček polní	0,15 kg/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–19 max. 1x na podzim
Mák setý	bejlomorka maková	0,15 kg/ha, 300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 55–61; ² podle signalizace max. 1x
Slunečnice	potemník písečný	0,15 kg/ha, 300–500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–39; ² podle signalizace max. 1x
Slunečnice	klopušky, třásněnky	0,15 kg/ha, 300–500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–65; ² podle signalizace max. 1x
Peckoviny	štítenka zhoubná	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	AT	² podle signalizace v době hromadného rozlézání nymf, max. 1x za rok
Třešeň, višň	zobonosky	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	² podle signalizace nejpozději na počátku růstu plůdků, max. 2x za rok (květopas peckový 1x, vrtule třešňová 1x, zobonosky 2x)
Třešeň, višň	květopas peckový	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	² podle signalizace max. 2x za rok (květopas peckový 1x, vrtule třešňová 1x, zobonosky 2x)
Třešeň, višň	vrtule třešňová	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	² podle signalizace, max. 2x za rok (květopas peckový 1x, vrtule třešňová 1x, zobonosky 2x)
Slivoň	zobonosky	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	² podle signalizace nejpozději na počátku růstu plůdků, max. 1x za rok
Maliník, ostružiník	bejlomorka ostružiníková	0,25 kg/ha, 200–1 000 l vody/ha	49	¹ před květem do balonového stadia květu, po sklizni, max. 2x za rok
Jetel luční	nosatčící rodu Apion	0,15 kg/ha, 300–400 l vody/ha	AT	¹ před květem až první rozkvetlé hlávky ² podle signalizace při překročení prahu škodlivosti; ³ semenné porosty, max. 1x za rok
Nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady	kříši	0,15 kg/ha, 300–600 l vody/ha (až 1 000 l/ha pro prostorové kultury)	AT	² podle signalizace max. 1x za rok
Cukrovka	makadlovka řepná	0,12 kg/ha, 200–400 l vody/ha	28	¹ BBCH 31–39 max. 1x
Ořešák	vrtule ořechová, mšice, puklice	0,25 kg/ha, 600–1 500 l vody/ha	14	¹ BBCH 70–89 max. 1x za rok

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jetel luční, nezemědělská půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, okrasné rostliny <50 cm, řepka olejka ozimá, cukrovka, mák, slunečnice	4	4	4	4
Okrasné rostliny >50 cm, maliník, ořešák, ostružiník, peckoviny, třešeň, višň	6	6	6	6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)				
Ořešák	5	0	0	0
Jetel luční, nezemědělská půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, okrasné rostliny <50 cm	5	5	0	0
Mák, okrasné rostliny >50 cm, slunečnice	5	5	5	0
Maliník, ostružiník, peckoviny, třešeň, višň	10	5	0	0

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

Cruiser OSR (metalaxyl-M 32,3 g/l, fludioxonyl 8 g/l, thiamethoxam 280 g/l), platnost od 2. 12. 2021 do 31. 3. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Mák setý	krytonosec kořenový	25 l/t osiva	AT	⁴ výsevек 1,75 kg/ha; moření

Poznámka: ⁴k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová

inzerce

PHOSAGRO®

ušlechtilá hnojiva

STABILNÍ DUSÍK

VYŠŠÍ VÝNOS

K dispozici pouze u nejlepších distributorů

www.phosagro.cz