

# Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí dokončení přehledu přípravků s rozšířeným použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 1. až 31. 1. 2022. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

## 3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

**Raldico 300 SL + další obchodní jméno Zorro 300 SL (pikloram 300 g/l), INNVIPO Sp. z o. o., Polsko, platnost do 31. 12. 2022**

| Plodina, oblast použití | Škodlivý organismus, jiný účel použití   | Dávkování, mísitelnost                                                                     | Ochranná lhůta (dny) | Poznámka                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ozimá řepka             | plevele dvouděložné jednoleté            | 0,078 l/ha, 200–300 l vody/ha                                                              | AT                   | <sup>1</sup> BBCH 13–21, na podzim<br><sup>2</sup> BBCH 12–16 max. 1x |
| Ozimá řepka             | plevele dvouděložné jednoleté            | 0,078 l/ha + 0,3 l/ha Major 300 SL – TM, 200–300 l vody/ha                                 | AT                   | <sup>1</sup> BBCH 13–14, na podzim<br><sup>2</sup> BBCH 10–16 max. 1x |
| Ozimá řepka             | plevele dvouděložné jednoleté            | 0,078 l/ha + 0,3 l/ha Major 300 SL – TM + 1,5 l/ha Meztotop 500 SC – TM, 200–300 l vody/ha | AT                   | <sup>1</sup> BBCH 13–14, na podzim<br><sup>2</sup> BBCH 10–16 max. 1x |
| Ozimá řepka             | plevele dvouděložné jednoleté            | 0,078 l/ha + 0,2 l/ha Major 300 SL – TM, 200–300 l vody/ha                                 | AT                   | <sup>1</sup> BBCH 20–21, na podzim<br><sup>2</sup> BBCH 10–16 max. 1x |
| Ozimá řepka             | pcháč oset, plevle dvouděložné jednoleté | 0,078 l/ha, 200–300 l vody/ha                                                              | AT                   | <sup>1</sup> BBCH 30–50, na jaře<br><sup>2</sup> BBCH 12–16 max. 1x   |
| Ozimá řepka             | pcháč oset, plevle dvouděložné jednoleté | 0,078 l/ha + 0,3 l/ha Major 300 SL – TM, 200–300 l vody/ha                                 | AT                   | <sup>1</sup> BBCH 30–50, na jaře<br><sup>2</sup> BBCH 12–16 max. 1x   |

Poznámka: <sup>1</sup>k plodině, <sup>2</sup>ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

**Ventola (kaptan 800 g/kg), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 31. 7. 2022**

| Plodina, oblast použití | Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost             | Ochranná lhůta (dny) | Poznámka                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jádroviny               | strupovitost                           | 1,88 kg/ha, 1 000 l vody/ha        | 21                   | <sup>1</sup> od BBCH 51 max. 10x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů                                          |
| Okrasné rostliny        | skvrnitost listů                       | 0,2 %, 200–400 l vody/ha           | AT                   | <sup>1</sup> BBCH 13–69<br><sup>2</sup> venkovní prostory, skleníky max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 10 dnů |
| Rajče                   | plíseň rajčete                         | 1,5–1,8 kg/ha, 150–1 000 l vody/ha | 21                   | <sup>1</sup> BBCH 71–85<br><sup>2</sup> pole max. 3x, interval mezi aplikacemi 10 dnů                               |

Poznámka: <sup>1</sup>k plodině, <sup>2</sup>ke umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

## Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

| Plodina                                                                                 | Bez redukce | Tryska 50 % | Tryska 75 % | Tryska 90 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)</b> |             |             |             |             |
| Jádroviny                                                                               | 25          | 20          | 15          | 6           |
| Okrasné rostliny >150 cm                                                                | 18          | 12          | 6           | 6           |
| Okrasné rostliny >50 cm, rajče                                                          | 4           | 4           | 4           | 4           |

Jádroviny: s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 20 m vegetačního pásu.

Okrasné rostliny >150 cm: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m.

Rajče: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost >3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

## 4. Rozšíření použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána.

## 5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

**Lentagran WP (pyridát 450 g/kg), platnost do 31. 12. 2031**

| Plodina, oblast použití              | Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost     | Ochranná lhůta (dny) | Poznámka                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česnek                               | plevele dvouděložné jednoleté          | 2 kg/ha, 200–300 l vody/ha | 56                   | <sup>1</sup> BBCH 13–14 max. 1x                                                                                 |
| Hrách zahradní, cizrna beraní, čočka | plevele dvouděložné                    | 1 kg/ha, 200–600 l vody/ha | AT                   | <sup>1</sup> BBCH 14–16<br><sup>2</sup> aplikace jednorázová max. 1x                                            |
| Hrách zahradní, cizrna beraní, čočka | plevele dvouděložné                    | 0,5 kg/ha                  | AT                   | <sup>1</sup> BBCH 12–16<br><sup>2</sup> aplikace opakovaná max. 1 kg/ha max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů |

Poznámka: <sup>1</sup>k plodině, <sup>2</sup>k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

## Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

| Plodina                                                                                               | Bez redukce | Tryska 50 % | Tryska 75 % | Tryska 90 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)</b>               |             |             |             |             |
| Česnek, hrách zahradní, cizrna, čočka                                                                 | 4           | 4           | 4           | 4           |
| <b>Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)</b> |             |             |             |             |
| Česnek                                                                                                | 5           | 5           | 0           | 0           |
| Hrách zahradní, cizrna, čočka                                                                         | 5           | 0           | 0           | 0           |

Česnek: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

**Vibrance Duo (fludioxonyl 25 g/l, sedaxan 25 g/l), platnost do 31. 10. 2022**

| Plodina, oblast použití        | Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost           | Ochranná lhůta (dny) | Poznámka                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lesní dřeviny – ošetření osiva | houbové choroby                        | 200 ml/100 kg, 5–1 500 ml/100 kg | –                    | <sup>1</sup> v průběhu skladování, před výsevem max. 1x (prostokořený způsob pěstování – pouze malá a střední semena), max. 3x (krytokořený způsob pěstování), interval mezi aplikacemi 30 dnů |

Poznámka: <sup>1</sup>k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

## 6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

Rozhodnutí nebyla vydána.

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová

## Rekordně velká jahoda

(fia, čtk) – Na izraelské farmě nedaleko Tel Avivu vyrostla obří jahoda, která se zapsala i do Guinnessovy knihy rekordů. S hmotností 289 gramů (299 se stopkou) a délkou 18 centimetrů pře-



I pěstitelé jahod usilují o zápis do Guinnessovy knihy rekordů  
Foto archiv

konala asi o 40 gramů dosud největší jahodu vypěstovanou v roce 2015 v japonském městě Fukuoka. Informoval o tom server The Times of Israel.

Jahodu, která měří v obvodu 34 centimetrů, objevili na své plantáži bratři Arielové v pátek. Hned v sobotu večer poslali žádost přes stránky Guinnessovy knihy rekordů a následující den za přítomnosti notáře provedli vážení, dokud byla jahoda ještě v plné zralosti. Později by ztratila na hmotnosti. Vážení natočili na video a na váhu nejprve pro srovnání položili iPhone, který vážil sotva polovinu.


„Rostla pomalu přes 45 dní od květu,“ citoval izraelský server jednoho ze čtyř bratrů. Podle něj chladné počasí v této sezóně způsobilo, že jahody zrály pomaleji, a některé tak srostly do jednoho obřího plodu. Letos jim uzrály čtyři obří jahody, ale jen jedna z nich překonala dosavadní japonský rekord, kterým byla jahoda vážící 250 gramů.

„Je to úžasný pocit a celá naše obec se z něj raduje s námi,“ řekl posléze médiím jeden z bratrů. Zda už rekordní jahodu ochutnali, ale neprozradil.

inzerce

KNIHA Z NAŠEHO VYDAVATELSTVÍ • KNIHA Z NAŠEHO VYDAVATELSTVÍ

## VÝŽIVA A HNOJENÍ POLNÍCH PLODIN



cena: 400 Kč

Nové vydání knihy vychází z potřeb praxe, výuky i snah o zvýšení znalostí a informovanosti odborné i laické veřejnosti. První část knihy se zabývá výživou rostlin, významem jednotlivých živin jejich vlivem na výši a kvalitu produkce. Druhá část pojednává o hnojivech, jejich vlastnostech a použití. Svým obsahem kniha přispívá k snadnější orientaci v oblasti výživy rostlin a racionálního hnojení.

autor: Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. a kolektiv  
vazba: pevná vazba, 235 x 310 mm  
počet stran: 224

## OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN

Objednávám ..... kusů publikace Výživa a hnojení polních plodin v ceně 440 Kč/kus

Jméno a příjmení .....

Adresa (včetně PSČ) .....

IČO ..... DIČ .....

Telefon ..... Podpis .....

Knihy objednávejte na adrese: Profi Press s. r. o., odbytové oddělení, Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2, tel.: 277 001 600, e-mail: odbyt@profiexpress.cz. Objednané knihy Vám budou zaslány na dobírku. K ceně zásluky se připočítává poštovné a balné.