

inzerce

Řepka ozimá

CORZOL

- * **Vysoký výnos semene**
104 % teplá oblast
106 % chladná oblast
- * **nízké nepoléhavé rostliny**
- * **vysoká HTS - 4,65 g**
- * **vysoký obsah oleje**
- * **bezproblémové zdraví**
- * **vybrána pro PREOL IDEAL**

selgen

Kolodějská 24, 250 84 Sibřina
e-mail: selgen@selgen.cz
www.selgen.cz

Přehled povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí dokončení přehledu přípravků s rozšířeným použitím nebo změnou v použití a přípravky pro minoritní použití za období 1. 3. až 31. 3. 2022. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

MOSPILAN MIZU 120 SL (acetamiprid 120 g/l), platnost do 28. 2. 2034

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Vojtěška	klopuška chlupatá, klopuška světlá, klopuška černá, klopuška polní	0,35 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 51–59 BBCH, nebo BBCH 69–71 ² semenné porosty; max. 1x
Vojtěška	kyjatka hrachová	0,35 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–59, nebo BBCH 69–79 ² semenné porosty; max. 1x
Jetel	nosatčici rodu <i>Apion</i> (nosatčík jetelový, nosatčík obecný)	0,35 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 51–59; ² semenné porosty; max. 1x
Jetel	kyjatka hrachová	0,35 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–59, nebo BBCH 69–85 ² semenné porosty; max. 1x
Lesknice kanárská	kohoutek modrý, kohoutek černý	0,35 l/ha, 200–400 l vody/ha	56	¹ BBCH 11–69; max. 1x
Lesknice kanárská	kyjatka travní, mšice střemchová, kyjatka osenní	0,35 l/ha, 200–400 l vody/ha	56	¹ BBCH 31–69; max. 1x
Mák setý	bejlomorka maková, krytonosec makovicový	0,25 l/ha		¹ BBCH 55–59; max. 1x
Mák setý	mšice	0,25 l/ha, 300 l vody/ha		¹ BBCH 31–59; max. 1x
Slunečnice	klopušky	0,25 l/ha, 300–500 l vody/ha		¹ BBCH 31–59; max. 1x
Brambor	mšice	0,4 l/ha, 300–600 l vody/ha		¹ BBCH 31–59 a BBCH 69–85 ² sadbové; max. 1x
Hrách, bob	kyjatka hrachová, zrnokaz hrachový	0,35–0,45 l/ha, 300–400 l vody/ha		¹ BBCH 31–59; ² semenné porosty; max. 1x
Hofčice	blyskáček řepkový	0,35 l/ha, 300–400 l vody/ha		¹ BBCH 31–59; ² semenné porosty; max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²k určené sklizni, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Vojtěška, jetel, lesknice kanárská, mák, slunečnice, brambor, hrách, bob, hofčice	4	4	4	4

PREV-GARD (sílice pomerančová 59 g/l), platnost do 30. 4. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jahodník	padlí, svilušky	40 ml/100 m ² , 10 l vody/100 m ²	–	¹ od fáze 2. rozvinutého listu do doby druhé sklizně; ² skleníky max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dní
Zelenina tykvovitá, zelenina plodová	plíseň, mšice, molice, svilušky	40–60 ml/100 m ² , 10 l vody/100 m ²	–	¹ od druhého pravého listu do plné zralosti; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dní
Zelenina listová, zelenina cibulová	padlí, alternariová skvrnitost	40–60 ml/100 m ² , 10 l vody/100 m ²	–	¹ od druhého pravého listu do plné zralosti; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dní
Zelenina listová, zelenina cibulová	mšice, molice	40 ml/100 m ² , 10 l vody/100 m ²	–	¹ od druhého pravého listu do dosažení typické velikosti; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dní
Petržel naťová, byliny, kořeninové rostliny a koření	plíseň, mšice	40 ml/100 m ² , 10 l vody/100 m ²	–	¹ od druhého pravého listu do konce kvetení; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dní
Cibule, pór, fenykl	třásněnky	60 ml/100 m ² , 10 l vody/100 m ²	–	¹ od druhého listu do dosažení typické velikosti; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dní
Reveň rebarbora, zelenina kořenová a hlíznatá	mšice	40 ml/100 m ² , 10 l vody/100 m ²	–	¹ od druhého listu do dosažení typické velikosti; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dní
Okrasné rostliny, okrasné dřeviny, růže	padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísňe (oomycety), mšice	0,4–0,6 % (40–60 ml/10 l vody)	–	¹ od druhého pravého listu do plné zralosti ² do počátku skanutí; ³ skleníky max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dní

Poznámka: ¹k plodině, ²k dávkování, ³k umístění, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

PREV-GOLD (sílice pomerančová 59 g/l), platnost do 30. 4. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jahodník	padlí, svilušky	2–4 l/ha, 500–1 000 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–89; ² skleníky max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Jahodník	padlí, svilušky	2–2,4 l/ha, 500–1 000 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–89 ² chráněné prostory, venkovní prostory max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Zelenina tykvovitá, zelenina plodová	plíseň, mšice, molice, svilušky	1,6–6 l/ha, 400–1 000 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–89; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Zelenina tykvovitá, zelenina plodová	plíseň, mšice, molice, svilušky	1,6–2,4 l/ha, 400–1 000 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–89 ² chráněné prostory, venkovní prostory max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Zelenina listová, zelenina cibulová	padlí, alternariová skvrnitost	0,8–3,6 l/ha, 200–600 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–89; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Zelenina listová, zelenina cibulová	padlí, alternariová skvrnitost	0,8–2,4 l/ha, 200–600 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–89 ² chráněné prostory, venkovní prostory max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Zelenina listová, zelenina cibulová	mšice, molice	0,8–2,4 l/ha, 200–600 l vody/ha	–	¹ skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Petržel naťová, byliny, kořeninové rostliny a koření	plíseň, mšice	0,8–2,4 l/ha, 200–600 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–69 ² skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Brukvovitá zelenina	mšice zelná, mšice, molice	1,2–2,4 l/ha, 300–1 000 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–49; ² venkovní prostory max. 3x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Cibule, pór, fenykl	třásněnky	4,8 l/ha, 200–800 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–49; ² skleníky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Reveň rebarbora, zelenina kořenová a hlíznatá	mšice	0,8–2,4 l/ha, 200–600 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–49 ² skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Okrasné rostliny, okrasné dřeviny, růže	padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísňe (oomycety), mšice, svilušky, molice, červci, puklice, zavřejč zimostrázový	1,6–6 l/ha	–	¹ BBCH 12–89 ² skleníky
Okrasné rostliny do 50 cm, okrasné dřeviny do 50 cm, růže do 50 cm	padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísňe (oomycety), mšice, svilušky, molice, červci, puklice, zavřejč zimostrázový	1,6–2,4 l/ha, 400–1 000 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–89 ² chráněné prostory, venkovní prostory max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Obilniny – ekologická produkce	kohoutci	1,6–2,4 l/ha, 400–1 000 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–89; ² venkovní prostory max. 3x, interval mezi aplikacemi 5–7 dnů
Luskoviny	mšice, svilušky	1,8–2,4 l/ha, 300–1 000 l vody/ha	–	¹ BBCH 12–89; ² venkovní prostory max. 3x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

(Pokračování na str. 29)

(Pokračování ze str. 28)

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jahodník, okrasné rostliny a dřeviny, růže (do 50 cm), tykvovitá zelenina, plodová zelenina, zelenina listová, zelenina cibulová, petržel naťová, byliny, kořeninové rostliny a koření, obilniny – ekologická produkce, luskoviny, brukvovitá zelenina, rebarbora, zelenina kořenová a hlíznatá	15	15	15	15

Score 250 EC (difenokonazol 250 g/l), platnost do 31. 12. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pažitka	padlí, plíseň cibulová, rzi	0,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	7	¹ po výsadbě, od BBCH 19 ² na počátku výskytu; ³ venkovní prostory; max. 1x za rok
Ovocné školky, okrasné školky	padlí, skvrnitost listů	0,2 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	max. 4x za rok
Rajče, paprika, okurka	padlí	0,4–0,8 l/ha, 1 000–2 000 l vody/ha	3	³ skleníky max. 3x, interval mezi aplikacemi 10–14 dnů
Jahodník	bílá skvrnitost listů jahodníku, fialová skvrnitost jahodníku, hnědnutí listů jahodníku	0,4 l/ha, 2 000 l vody/ha	3	¹ před květem, po sklizni max. 3x za rok
Maliník, ostružiník	didymelové odumírání maliníku, rez maliníková	0,4 l/ha, 1 000 l vody/ha	7	¹ před květem, po sklizni ² při prvním výskytu max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Okrasné rostliny	padlí, rzi, skvrnitost listů	0,02 % do počátku skanutí, 0,2 l/ha plošné použití, 1 000 l vody/ha	2	² preventivně nebo při prvním výskytu ³ OL pro vstup do porostu a následné práce max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Cibule, česnek	kladosporiová skvrnitost listů, alternariová skvrnitost česnekovitých	0,4 l/ha, 400–600 l vody/ha	21	¹ od BBCH 41 ³ venkovní prostory max. 1x
Mrkev	cerkosporiová listová skvrnitost mrkve, padlí miříkovitých, suchá skvrnitost listů mrkve, černá hniloba mrkve	0,4 l/ha, 400–800 l vody/ha	21	¹ BBCH 41–49 ³ venkovní prostory max. 3x, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Petržel kořenová	skvrnitost listů, rzi, padlí miříkovitých	0,4 l/ha, 400–600 l vody/ha	21	¹ od BBCH 13; ³ venkovní prostory ⁶ pro kořen; max. 1x
Řepa salátová	cerkosporióza řepy, větevnatka řepná	0,4 l/ha, 400–600 l vody/ha	28	¹ od BBCH 12; ³ venkovní prostory ⁶ pro bulvy; max. 1x

(Pokračování na str. 30)

inzerce

Certifikovaný poradce

Společnost Agroteam CZ s.r.o. prošla náročným procesem certifikace poradenských služeb v zemědělství a nyní může pro své služby užívat chráněnou značku Advigreen jako první v České republice.

Certifikát zaručuje, že poradenské služby, které poskytujeme, jsou nejen kvalitní a správně řízené, ale pro klienty bude naše služba nově také dotována. Chráněná značka Advigreen je udělena na tři roky od provedení certifikačního auditu

klienty v maximální míře pozitivní dosah v poskytovaném poradenství.

V průběhu platnosti certifikátu se provádí také každý rok dozorový audit, který ověří, zdali je systém řízení udržován, neustále zlepšován a je tedy možno pone-

tě a jsme rádi, že jsme první certifikát vydaný v ČR obdrželi právě my.

Získaný certifikát Advigreen také umožní zemědělským klientům využívat poradenské služby naší společnosti s významnou dotační podporou. Certifikace



Certifikovaný Agroteam CZ, zleva Michal Weber, Jaroslava Špalková, Zdeněk Kučera, za certifikační orgán ÚZEI Olga Králíková
Foto archiv firmy

certifikačním orgánem pověřeným Ministerstvem zemědělství, kterým je Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Samotný proces certifikace trval rok, vyžadoval splnění řady náročných kritérií a vedl k zavedení takového systému poradenství, který bude mít na naše

chat udělený certifikát v platnosti. Tímto krokem je zajištěna schopnost držitele nadále poskytovat poradenské služby profesionálně. V opačném případě je takovému subjektu certifikát odebrán. Pro společnost Agroteam CZ je kvalita poskytovaných služeb vždy na prvním mís-

ta tak zprostředkuje nejen dohled nad poradenskými subjekty nezávislými auditory, ale právě dotační podpora zajistí lepší dostupnost poradenství pro všechny zemědělce.

Ing. Jaroslava Špalková
Agroteam CZ s.r.o.

inzerce

LOVO
CHEMIE

ZENFERT® 24 N

Moderní hnojivo
s vyšším využitím dusíku

www.lovochemie.cz
www.mojehnojiva.cz

HNOJIVA
SE ZEOLITY

ČLEN KONCERNU AGROFERT

Přehled povolení ...

(Dokončení ze str. 29)

Score 250 EC (difenokonazol 250 g/l), platnost do 31. 12. 2022 (Dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Tykev	padlí dýňovitých, alternariová skvrnitost dýňovitých	0,4 l/ha, 600–1 200 l vody/ha	3	"BBCH 51–70" "venkovní prostory" max. 2x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů

Poznámka: "k plodina, "ke škodlivému organismu, "k ochranné lhůtě, "k umístění, "k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jahodník, pažitka, okrasné rostliny do 50 cm, ovocné a okrasné školky do 50 cm, cibule, česnek, mrkev, petržel, řepa salátová, tykev	4	4	4	4
Okrasné rostliny do 50 cm, ovocné a okrasné školky 50–150 cm	6	6	6	6
Maliník, ostružiník	9	4	4	4
Okrasné rostliny nad 150 cm, ovocné a okrasné školky nad 150 cm	20	14	9	6

Jahodník, pažitka, ovocné a okrasné školky do 50 cm, cibule, česnek, tykev: s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Ovocné a okrasné školky 50–150 cm: s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Maliník, ostružiník: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažujících pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <9 m.

Ovocné a okrasné školky nad 150 cm: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažujících pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m.

inzerce

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

Actara 25 WG (thiamethoxam 250 g/kg), platnost od 13. 4. 2022 do 11. 8. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Chmel	šedavka luční, drátovci, lalokonosec libečkový, dřepčík chmelový	0,2 kg/ha, 600 l vody/ha	AT	"BBCH 11–33" max. 1x za rok

Poznámka: "k plodina, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Chmel	6	6	6	6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu nečlověkových rostlin (m)				
Chmel	10	10	10	10

Curatio (polysulfid vápenatý 380 g/l), platnost od 1. 4. 2022 do 28. 7. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jádroviny – ekologická produkce	strupovitost	18 l/ha (6 l/1 m výšky koruny/ha), 500–1 500 l vody/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)	7	"BBCH 54–80" max. 8x za rok, interval mezi aplikacemi 3 dny

Poznámka: "k plodina, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jádroviny	30	25	16	10
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu nečlověkových členovců (m)				
Jádroviny	30	20	15	5

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová

Propracované řešení meziplodin

Meziplodiny jsou výborným prostředkem pro obohacení osevních postupů o přínosné plodiny s řadou pozitivních efektů. Používané druhy s dostatečně rychlým růstem nadzemní a kořenové hmoty omezují erozi, zúrodňují půdu, zlepšují její strukturu, ochraňují živiny před vyplavováním a hlavně zlepšují bilanci organické hmoty v půdě. Tím v dlouhodobém horizontu zvyšují udržitelnost osevních postupů a rostlinné výroby jako celku.

Meziplodiny nepřibuzné s kulturními druhy (svazenka, pohanka, jetele a další) omezují rozvoj chorob a škůdců. Některé přímo kontrolují konkrétní patogeny, např. háďátka (*Trichoderma*, *Pratylenchus*), poškozující okopaniny, můžeme regulovat vhodnými odrůdami ředkve nebo ovesa hřebíkatého.

viterra®UNI

Směsi meziplodin viterra® od SAATEN-UNION jsou navrženy, aby kombinovaly tyto benefity a zároveň splňovaly pravidla greeningu a další požadavky praxe, např. na snadné vymlazování, vhodnost do různých klimatických a půdních podmínek nebo osevních postupů.



Bc. Klára Kohlmünzer, produktová manažerka SAATEN-UNION CZ s. r. o. Foto archiv firmy

Stejně jako minulý rok i letos obsahuje náš sortiment směs viterra®UNI. Je to univerzální

kombinace čtyř plodin: svazenky, lnu, jetele a ovesa hřebíkatého a je vhodná do všech osevních postupů včetně těch s vysokým zastoupením řepky. Má rychlý růst a dobře odolává suchu. Podporuje úrodnost půdy využitím rozdílné architektury kořenových systémů u jednotlivých komponent směsi. Směs netvoří časné semena a přes zimu dobře vymlazá.

viterra®PS

Nejoblíbenější směs viterra® v České republice je viterra®PS, kombinace pohanky a svazenky ve vyrovnaném poměru rostlin, která je svou jednoduchostí a univerzálností vhodná pro většinu osevních postupů. Zároveň rovněž dobře zvládá suchu a snadno vymlazá.

viterra®HS

Pro krátké vegetační období, kdy jsou potřeba rychle rostoucí druhy, je výhodná směs viterra®HS, hořčice a svazenka, která má jednak rychlý růst nadzemní i kořenové hmoty, jednak dobře roste i v suchých podmínkách.

Meziplodiny obsahující ředkev olejnou mají nesporný přínos pro kvalitu půdy. Díky hlubokému křídlovému kořenu je ředkev olejná schopná rozrušit utužené vrstvy půdy, zlepšit fyzikální vlastnosti a napravit půdní vodní a živinový režim. Směs viterra®RS plus (ředkev, svazenka a pohanka) má zároveň vynikající předplodinou hodnotu pro hluboce kořenicí plodiny.

viterra®TOP

Na oblíbenosti u našich pěstitelů stále nabírá vysoce komplexní směs viterra®TOP. Ta se skládá dokonce z šesti komponent, svazenky, jetele alexandrijského a perského, vikve, lupiny a slunečnice. Tato pestrá směs tvoří vysoce přínosnou kombinaci pro

půdu i pro užitečný hmyz a zvěř. Pro získání maximálního efektu z této směsi je ideální poskytnout

plodinám dostatek času pro vykvetení, tedy vysévat nejpozději do první poloviny srpna.

Bc. Klára Kohlmünzer
produktová manažerka
SAATEN-UNION CZ s. r. o.

inzerce

Směsi meziplodin pro GREENING

viterra® PS

Směs pohanky a svazenky. Jediné řešení do OP s řepkou. Ideální volba také pro obilniny nebo kukuřici.

viterra® TOP

Směs svazenky, jetele alexandrijského, jetele perského, vikve seté, lupiny úzkolisté a slunečnice. Směs pro profíky.

viterra® HS

Směs hořčice a svazenky. Oblíbená směs do OP s žádným nebo nízkým zastoupením řepky. Vhodná pro následné setí do mulče.

viterra® UNI

Univerzální směs obsahující oves hřebíkatý, svazenku vratičolistou, jetele alexandrijský a len. Vhodná do OP s řepkou.

viterra® RS plus

Směs ředkve olejné, svazenky a pohanky s maximálně příznivým efektem na půdu a intenzivním prokořeněním půdního profilu.



Zastoupení druhů v porostu



Zastoupení jednotlivých druhů ve směsi viterra®UNI



Zapojený mladý porost viterra®UNI

Foto archiv firmy



SAATEN-UNION CZ

SAATEN-UNION CZ

www.saaten-union.cz

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft