

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí pokračování přehledu přípravků pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 5. až 31. 5. 2022. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Mospilan 20 SP (acetamiprid 200 g/kg), platnost do 30. 4. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá řepka	zápředník polní	0,15 kg/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–19; max. 1x na podzim
Mák setý	bejlomorka maková	0,15 kg/ha, 300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 55–61; ² podle signalizace max. 1x
Slunečnice	potemník písečný	0,15 kg/ha, 300–500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–39; ² podle signalizace max. 1x
Slunečnice	klopušky, třásněnky	0,15 kg/ha, 300–500 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–65; ² podle signalizace max. 1x
Peckoviny	štítenka zhoubná	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	AT	² podle signalizace v době hromadného rozlézání nymf max. 1x za rok
Třešeň, višně	zobonosky	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	² podle signalizace nejpozději na počátku růstu plůdků; max. 2x za rok
Třešeň, višně	květopas peckový	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	² podle signalizace max. 1x za rok
Třešeň, višně	virtule třeshňová	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	² podle signalizace max. 1x za rok
Slivoň	zobonosky	0,25 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	² podle signalizace nejpozději na počátku růstu plůdků; max. 1x za rok
Maliník, ostružiník	bejlomorka ostružiníková	0,25 kg/ha, 200–1 000 l vody/ha	49	¹ před květem do balonového stadia květu, po sklizni; max. 2x za rok
Jetel luční	nosatčici rodu <i>Apion</i>	0,15 kg/ha, 300–400 l vody/ha	AT	¹ před květem až první rozkvetlé hlávky ² podle signalizace při překročení prahu škodlivosti; ³ semenné porosty max. 1x za rok
Nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady	kříši	0,15 kg/ha, 300–600 l vody/ha (až 1 000 l/ha pro prostorové kultury)	AT	² podle signalizace max. 1x za rok
Cukrovka	makadlovka řepná	0,12 kg/ha, 200–400 l vody/ha	28	¹ BBCH 31–39
Ořešák	virtule ořešková, mšice, puklice	0,25 kg/ha, 600–1 500 l vody/ha	14	¹ BBCH 70–89 max. 1x za rok
Ostrostřelec mariánský	mšice, babočka bodláková – housenky	0,15–0,25 kg/ha, 200–400 l vody/ha	14	³ množitelé porosty max. 2x v intervalu 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití	Zákaz, omezení
Jetel luční	zákaz zkrmování slámy
Nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady	ošetřené rostliny nesmějí být použity k jídlu ani zkrmovány

Ochranná vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jetel luční, nezemědělská půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, okrasné rostliny <50 cm, ozimá řepka, cukrovka, mák, slunečnice, ostrostřelec mariánský	4	4	4	4
Okrasné rostliny >50 cm, maliník, ořešák, ostružiník, peckoviny, třešeň, višně	6	6	6	6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)				
Ořešák	5	0	0	0
Jetel luční, nezemědělská půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, okrasné rostliny <50 cm	5	5	0	0
Mák, okrasné rostliny >50 cm, slunečnice	5	5	5	0
Maliník, ostružiník, peckoviny, třešeň, višně	10	5	0	0

NeemAzal-T/S (azadirachtin 10,6 g/l), platnost do 31. 5. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jilm	bělokaz jilmový	10–30 ml/1 l vody, 100–1 000 ml/strom, podle velikosti stromu	–	¹ BBCH 20–99, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu injektáž, max. 1x za rok
Lípa	zdobnatka lipová	10–30 ml/1 l vody, 100–1 000 ml/strom, podle velikosti stromu	–	¹ BBCH 20–99, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu injektáž, max. 1x za rok
Smrk	korovnice smrková	10–30 ml/1 l vody, 100–1 000 ml/strom, podle velikosti stromu	–	¹ BBCH 20–99, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu injektáž, max. 1x za rok
Stromy listnaté opadavé	bekyně zlatořitná	10–30 ml/1 l vody, 100–1 000 ml/strom, podle velikosti stromu	–	¹ BBCH 20–99, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu injektáž, max. 1x za rok
Bez černý	savý hmyz, žravý hmyz	3 l/ha, 400–800 l vody/ha	7	² při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3 max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Jádroviny mimo hrušeň	savý hmyz, žravý hmyz, minující škůdci	4,5 l/ha (1,5 l/1 m výšky koruny/ha), 300–1 500 l vody/ha (max. 500 l vody/1 m výšky koruny/ha)	14	¹ BBCH 70–80 ² při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3 max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 10–14 dnů

NeemAzal-T/S (azadirachtin 10,6 g/l), platnost do 31. 5. 2025 (dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Meruška, třešeň, broskvoň, slivoň	mšice, píďalky	3 l/ha (1 l/1 m výšky koruny/ha), 500–1 500 l vody/ha (max. 500 l vody/1 m výšky koruny/ha)	7	¹ od BBCH 57; ² při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L2 max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Chřest	savý hmyz, žravý hmyz	3 l/ha, 300–600 l vody/ha	AT	¹ po sklizni ² při prvních příznacích napadení ³ venkovní prostory max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Jahodník	obaleči, píďalky, housenky škodlivých motýlů	3 l/ha, 400–800 l vody/ha	3	² při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3 max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Brusnice, brusinka, borůvka, klikva, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, růže šípová, morušovník, hloh, a ostatní bobulovité a drobné ovoce	obaleči, píďalky, housenky škodlivých motýlů	3 l/ha, 400–800 l vody/ha	7	² při výskytu, od: larvální stupeň L1, do: larvální stupeň L3 max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů
Réva	křísek révový	3 l/ha, 400–800 l vody/ha	–	¹ do BBCH 61 ² školy, matečné vinice max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jádroviny mimo hrušeň, meruňky, třešně, broskve, švestky	20	14	9	6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)				
Jádroviny mimo hrušeň, meruňky, třešně, broskve, švestky	20	15	10	0
Bez černý, maliny, ostružiny, rybíz, angrešt, šípky, moruše, hloh a ostatní bobulovité a drobné ovoce mimo jahodník, brusnici, brusinku, borůvku a klikvu	5	0	0	0

Jádroviny mimo hrušeň, meruňky, třešně, broskve, švestky: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m.

Switch (cyprodinil 375 g/kg, fludioxonil 250 g/kg), platnost do 30. 4. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Maliník, ostružiník	plíseň šedá, didymelové odumírání maliníku	1 kg/ha, 300–1 000 l vody/ha	10	² preventivně, při prvním výskytu max. 3x za rok
Okurka, rajče, paprika	plíseň šedá, hlízenka obecná	0,8 kg/ha, 1 000–2 000 l vody/ha	3	² preventivně, při prvním výskytu ³ skleníky max. 3x, interval mezi aplikacemi 10–14 dnů
Zelenina kořenová (mimo řepy salátové, ředkve, tuřín, vodnice)	skládkové choroby	0,5–1 kg/ha, 400–600 l vody/ha	7	² preventivně, při prvním výskytu max. 3x, interval mezi aplikacemi 12 dnů
Zelenina cibulová	skládkové choroby	0,5–1 kg/ha, 400–600 l vody/ha	14	² preventivně, při prvním výskytu max. 3x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Hrách	plíseň šedá	0,5–1 kg/ha, 400–600 l vody/ha	14	² preventivně, při prvním výskytu max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dnů
Celer bulvový	skládkové choroby	0,5–1 kg/ha, 400–600 l vody/ha	14	² preventivně, při prvním výskytu max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Maliník, ostružiník	12	7	6	6
Kořenová zelenina, cibulová zelenina, hrách	4	4	4	4

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (tzv. výjimka na 120 dnů)

Pyrethrin (pyrethrin 40 g/l), platnost od 1. 6. 2022 do 28. 9. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Réva	křísek révový	0,75 l/ha, 400–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 71–79; max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Réva	40	25	16	9

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <40 m.