

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití, přípravky pro minoritní použití a řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin za období 1. 6. až 30. 6. 2022. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

HERBIPROTECT SPRAY, nové malobalení (kyselina pelargonová 30 g/l), SBM Développement S. A. S., Francie, platnost do 31. 8. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Nezpevněné a zpevněné plochy	plevele jednoleté, dvouleté a vytrvalé; mechy	1 l/10 m ²	AT	² postemergentně max. 8x, interval mezi aplikacemi 21–28 dnů
Okolo okrasných keřů, bobulovin, ovocných stromů	plevele jednoleté, dvouleté a vytrvalé; mechy	1 l/10 m ²	AT	² postemergentně max. 8x, interval mezi aplikacemi 21–28 dnů

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Rozhodnutí nebyla vydána

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Proman + další obchodní jméno Soletto, Inigo (metobromuron 500 g/l), Belchim Crop Protection NV/SA, Belgie, platnost do 31. 12. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	lipnice roční, ježatka kuří noha, plevle dvouděložné jednoleté	3–4 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ před vzejtím max. 1x
Sója	plevele dvouděložné jednoleté	3 l/ha, 150–400 l vody/ha	AT	¹ před vzejtím max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranná vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu nečlověkových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Brambor, sója	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu nečlověkových rostlin (m)				
Brambor	5	0	0	0

Brambor: s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

4. Rozšíření použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Amistar Gold (azoxystrobin 125 g/l, difenokonazol 125 g/l), platnost do 31. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Řepa krnná	cerkosporioza řepy, rez řepná, padlí řepy, větvnatka řepná, rizoktoniová hniloba	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	¹ BBCH 39–49 max. 2x, interval mezi aplikacemi 21 dnů
Lnička setá, brukev řepák	hlízenka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 59–69 max. 1x
Hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sarepská	hlízenka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 59–69 ⁶ na semeno max. 1x
Mák setý	hlízenka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 59–69 max. 1x
Len setý	hlízenka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 59–69 ⁶ na olej, vlákno, na semeno; max. 1x
Konopí seté	hlízenka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 59–69 ⁶ na vlákno, pouze nepotravinářské účely max. 1x
Jarní řepka	alternariová skvrnitost brukvovitých	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–69 max. 1x
Lnička setá jarní	fomová hniloba slunečnice, alternariová skvrnitost	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–69 ⁶ max. 1x
Lnička setá ozimá, brukev řepák	fomová hniloba slunečnice, alternariová skvrnitost	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 14–29 na podzim, BBCH 31–69 na jaře ⁶ max. 2x (1x na podzim, 1x na jaře)

(Pokračování na str. 24)

Specialisté pro pozdní setí

PŠENICE OZIMÁ

ASKABAN^A

Mimořádný výnos a potravinářská kvalita

- ✓ Vysoký výnos
- ✓ Výborné stabilní potravinářské parametry
- ✓ Vysoká plasticita
- ✓ Vysoká mrazuvzdornost

SU TARROCA^B

Excelentní výnos a vysoká plasticita

NOVINKA
2022

- ✓ Mimořádně vysoký stabilní výnos
- ✓ Vysoká plasticita
- ✓ Dobrá odolnost proti poléhání
- ✓ Vynikající odrůdový profil

GENIUS^{E+}

Odrůda v nejvyšší jakosti pekařské kvality „E+“

- ✓ Vysoký výnos kvalitního zrna
- ✓ Mimořádná pekařská kvalita
- ✓ Zimovzdornost a mrazuvzdornost

EXPO^E

Specialista na velmi pozdní setí i po kukuřici

- ✓ TOP výnos zrna v E sortimentu odrůd
- ✓ Mimořádná odolnost k fuzáriím v klase
- ✓ Velmi dobrá mrazuvzdornost

Kvalitní certifikované osivo k dostání u všech významných osivářských firem v ČR.



Saaten-Union CZ

SAATEN-UNION CZ

www.saaten-union.cz

**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft

Přehled nových ...

(Dokončení ze str. 23)

Amistar Gold (azoxystrobin 125 g/l, difenokonazol 125 g/l), platnost do 31. 12. 2023 (dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská	fomová hniloba, alternariová skvrnitost	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–69 ^a na semeno max. 1x
Slunečnice	padlí slunečnice, alternariová skvrnitost slunečnice, rzivost slunečnice	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–65 max. 1x
Sója	cerkosporová listová skvrnitost, antraknóza, purpurová skvrnitost sóje, hlízenka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–65 max. 1x
Mák setý	fomová hniloba, padlí máku, alternariová skvrnitost	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–69 max. 1x
Len setý	fomová hniloba, antraknóza, septoriová skvrnitost, alternariová skvrnitost	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–69 ^a na olej, vlákno, na semeno max. 1x
Konopí seté	fomová hniloba	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 31–55 ^a na vlákno, pouze nepotravinářské účely max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ^ak dávkování, ^kurčení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Konopí seté, len, mák, sója, slunečnice, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, brukev řepák, lníčka setá, řepka olejka jarní, řepa krmná	4	4	4	4

Pro aplikaci do slunečnice a krmné řepy: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Pro aplikaci do lníčky seté ozimé a brukev řepáku: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Lentagran WP (pyridát 450 g/kg), platnost do 31. 12. 2031

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Česnek	plevele dvouděložné jednoleté	2 kg/ha, 200–300 l vody/ha	56	¹ BBCH 13–14 max. 1x
Hrách zahradní, cizrna beraní, čočka	plevele dvouděložné	1 kg/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 14–16 ^a aplikace jednorázová
Hrách zahradní, cizrna beraní, čočka	plevele dvouděložné	0,5 kg/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–16 ^a aplikace opakovaná, max. 1 kg/ha, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Mrkev	plevele dvouděložné jednoleté	0,5 kg/ha, 200–600 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–16 max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ^ak dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Mrkev, česnek, hrách zahradní, cizrna, čočka	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Česnek	5	5	0	0
Hrách zahradní, cizrna, čočka	5	0	0	0

Česnek: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Merpan 80 WG (kaptan 800 g/kg), platnost do 31. 7. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Třešeň, višně	skvrnitost listů, glomerelová hniloba třešně	1,8 kg/ha (0,6 kg/1 m výšky koruny/ha), 500–1 000 l vody/ha	21	¹ BBCH 19–79 ^a venkovní prostory max. 4x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů ¹ BBCH 51–87
Borůvka	skvrnitost listů, antraknóza, plíseň šedá	1,8 kg/ha, 200–1 000 l vody/ha	14	^a venkovní prostory, chráněné prostory max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů ¹ BBCH 51–85
Maliník, ostružiník	skvrnitost listů, plíseň šedá	1,8 kg/ha, 200–1 000 l vody/ha	7	^a max. 2x za rok s intervalem 14 dní ^a venkovní prostory, chráněné prostory
Maliník, ostružiník	didymelové odumírání maliníku, skvrnitost ostružiníku	1,8 kg/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	¹ BBCH 09–10 (při rašení), nebo BBCH 91–97 (po sklizni) ^a max. 1x za rok ^a venkovní prostory
Angrešt, rybíz	antraknóza, skvrnitost listů	1,8 kg/ha, 200–1 000 l vody/ha	7	¹ BBCH 55–79 ^a venkovní prostory max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 14 dnů ¹ BBCH 53–59
Jahodník	skvrnitost listů, antraknóza jahodníku	1,8 kg/ha (venkovní prostory), 1,5 kg/ha (chráněné prostory), 200–1 000 l vody/ha	14/21	^a venkovní prostory 14 dnů, chráněné prostory 21 dnů ^a venkovní prostory, chráněné prostory max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů

Merpan 80 WG (kaptan 800 g/kg), platnost do 31. 7. 2022 (dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Okrasné školky, ovocné školky	skvrnitost listů	0,2 %, 200–600 l vody/ha	AT	max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ^ak ochranné lhůtě, ^kk dávkování, ^kk umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Třešně, višně	25	18	14	6
Borůvka, maliník, ostružiník, angrešt, rybíz	7	6	6	6
Jahodník	4	4	4	4
Okrasné a ovocné školky 50–150 cm	6	6	6	6
Okrasné a ovocné školky >150 cm	20	14	10	6

Třešně, višně: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <25 m.
Při aplikaci do ovocných a okrasných školek 50–150 cm: s ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Při aplikaci do ovocných a okrasných školek >150 cm: SpE2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m.

Savvy (metsulfuron-methyl 200 g/kg), platnost do 31. 3. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Len	plevele dvouděložné jednoleté	30 g/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 11–39 ^a 10–16 max. 1x
Invasní dřeviny	pajasán žláznatý, trnovník akát (likvidace)	200 g/ha	–	injektáž kmene, max. 2x za rok s intervalem dva měsíce

Poznámka: ¹k plodině, ^ake škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní, (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Len	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Len	20	10	5	5

TEBKIN (tebukonazol 250 g/l), platnost do 31. 8. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Okrasné rostliny	padlí, rzi	1 l/ha, 1 000 l vody/ha	2	max. 1x za rok
Ovocné školky, okrasné školky	rzi	0,75–1 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	AT	max. 1x za rok
Ředkev olejná	fomová hniloba brukvovitých	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 13–51 ^a produkce osiva max. 1x
Ředkev olejná	alternariová skvrnitost brukvovitých, hlízenka obecná	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ od BBCH 55 ^a produkce osiva max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ^ak určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ředkev olejná, okrasné rostliny <50 cm	4	4	4	4
Okrasné rostliny 50–150 cm, ovocné a okrasné školky 50–150 cm	7	6	6	6
Okrasné rostliny >150 cm, ovocné a okrasné školky >150 cm	30	25	18	12
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Okrasné rostliny >150 cm, ovocné a okrasné školky >150 cm	10	0	0	0

Ředkev olejná: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Okasné rostliny <50 cm: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Okasné rostliny 50–150 cm, ovocné a okrasné školky 50–150 cm: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Okasné rostliny >150 cm, ovocné a okrasné školky 50–150 cm: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ≥3°) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Tern 750 EC (fenpropidín 750 g/l), platnost do 31. 12. 2022

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Řepa krmná	padlí, cerkosporiáza řepy, větevnatka řepná, rez řepná	0,5 l/ha, 150–600 l vody/ha	28	¹ BBCH 39–49 max. 2x, interval mezi aplikacemi 21 dnů

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Řepa krmná	30	14	7	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

6. Povolení přípravku pro řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin

Nařízení nebylo vydáno

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová