

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků a přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití za období 1. 5. až 31. 5. 2022. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Battery (dikamba 17,8 g/l, MCPA 161 g/l), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 31. 10. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice, jarní ječmen	plevele dvouděložné jednoleté	5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 21–32 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, jarní ječmen	4	4	4	4

Pro aplikaci do ozimé pšenice: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Greteq (difenokonazol 250 g/l), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice, tritikale	rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná	0,4–0,5 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–69 max. 1x
Žito	rez žitná	0,4–0,5 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BCH 30–69 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, žito, tritikale	4	4	4	4

Jarní pšenice, jarní žito, jarní tritikale: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Osorno 480 (mesotrion 480 g/l), GLOBACHEM nv., Belgie, platnost do 31. 5. 2033

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	plevele dvouděložné jednoleté	0,2–0,3 l/ha, 180–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 00–09 ² preemergentně max. 1x v plodině
Kukuřice	plevele dvouděložné jednoleté	0,2–0,27 l/ha, 180–300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 10–18 ² postemergentně max. 1x v plodině

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Kukuřice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Kukuřice	10	5	5	0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Tachigaren LS (hymexazol 440 g/l), Mitsui Chemicals Agro, Japonsko, platnost do 31. 5. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Cukrovka	spála řepy	31,8–63,6 ml na výsevní jednotku (100 000 semen)	AT	⁴ výsev max. 1,5 VJ/ha moření

Poznámka: ⁴k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Yankee + další obchodní jméno Yukon (sírán měďnatý zásaditý 163 g/l: vyjádřeno jako obsah mědi 80 g/l, síra 640 g/l), UPL Holdings Coöperatief U. A., Nizozemsko, platnost do 31. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Réva	padlí révy, plíseň révy	3 l/ha, 500 l vody/ha do BBCH 61 6 l/ha, 1 000 l vody/ha od BBCH 61	7	¹ BBCH 09–81 max. 8x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů ¹ BBCH 19–49 max. 5x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Cukrovka, řepa krmná, řepa salátová	cerkosporiáza řepy	5,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	14	

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Réva, cukrovka, krmná a salátová řepa	50	50	50	20

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Rozhodnutí nebyla vydána

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Basagran (bentazon 480 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 31. 5. 2026

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 13–29 max. 1x
Trávy – semenné porosty	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 13–29 max. 1x

Basagran (bentazon 480 g/l), BASF SE, Německo, platnost do 31. 5. 2026 (Dokončení tabulky)

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ do BBCH 18 max. 1x
Bob, hrách na zmo, hrách na zeleno, peluška, luskovino-obilní směsky	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ do BBCH 17 max. 1x
Sója	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 11–13 max. 1x
Fazol	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–13 max. 1x
Kukuřice s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ do BBCH 18 kukuřice max. 1x
Len	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ do BBCH 15 max. 1x
Brambor	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ do BBCH 19 max. 1x
Bob s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ do BBCH 17 bobu max. 1x
Obilniny (pouze pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves) s podsevem vojtěšky, jetele lučního nebo trav na semeno	plevele dvouděložné, heřmánek, rmen	2 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ do BBCH 29 obilnin max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití	Zákaz, omezení
Trávy – semenné porosty	zákaz zkrmování sena
Kukuřice s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního; bob s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního; obilniny (pouze pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves) s podsevem vojtěšky, jetele lučního nebo trav na semeno	zákaz zkrmování podsevu

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Kukuřice, sója, brambor, obilniny, len, luskovinoobilní směsky, bob, fazol, hrách na zmo, hrách na zeleno, peluška, trávy – semenné porosty, bob s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, kukuřice s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem trav na semeno	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Kukuřice, sója, brambor, obilniny, len, luskovinoobilní směsky, bob, fazol, hrách na zmo, hrách na zeleno, peluška, trávy – semenné porosty, bob s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, kukuřice s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem vojtěšky nebo jetele lučního, obilniny s podsevem trav na semeno	5	0	0	0

Callisto 100 SC (mesotrion 100 g/l), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 5. 2033

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	plevele dvouděložné jednoleté, ježatka kuří noha	1,2 l/ha, 300 l vody/ha	AT	¹ BBCH 12–18 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Kukuřice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Kukuřice	30	20	10	5

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Folpan Gold (metalaxyl-M 48,5 g/kg, folpet 400 g/kg), Adama CZ s. r. o., Dolní Břežany, platnost do 31. 7. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Chmel	plíseň chmele	2,7 kg/ha, 1 200 l vody/ha do BBCH 37 4 kg/ha, 2 200 l vody/ha od BBCH 37	14	¹ BBCH 21–55 max. 1x za rok ¹ BBCH 53–79 max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 10 dnů
Réva (moštové odrůdy)	plíseň révy	1 kg/ha, 500 l vody/ha do BBCH 61 2 kg/ha, 1 000 l vody/ha od BBCH 61	28	

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Chmel	30	25	18	8
Réva	6	6	6	6

Chmel: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

(Dokončení přehledu najdete v některém dalším čísle týdeníku Zemědělec.)

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová