

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití a přípravky pro minoritní použití za období 1. 9. až 30. 9. 2022. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější údaje.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Curando + další obchodní jméno GLOBIF, NARITA XL, Spinner XL, Difure XL, Kix XL, Subigon, Agrizole XL (difenokonazol 500 g/l), GLOBACHEM nv., Belgie, platnost do 31. 12. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Cukrovka, řepa krmná	rez řepná	0,25 l/ha, 100–400 l vody/ha	21	¹ BBCH 39–49 max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Řepka olejka	fomové černání stonků řepky, alternariová skvrnitost brukvovitých, hlízka obecná	0,125 l/ha na podzim, 0,25 l/ha na jaře, 100–400 l vody/ha	56	¹ BBCH 19–69 max. 2x do celkové dávky 0,5 l/ha, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Cukrovka, řepa krmná, řepka olejka	4	4	4	4

Cukrovka, řepa krmná: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svahovitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Řepka olejka: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svahovitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Delfin WG (Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki strain SA-11 850 g/kg – 4,85 x 10¹³ CFU/kg; 32 000 IU/mg), Mitsui AgriScience International S. A./N. V., Belgie, platnost do 30. 4. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jabloň, hrůšeň	píďalka podzimní, obaleč ovocný	0,075 % (7,5 g/10 l vody)	AT	¹ od dokvétání do konzumní zralosti ² na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stadia larvy ⁴ do počátku skanutí max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Réva	obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý	0,075 % (7,5 g/10 l vody)	AT	¹ od fáze zřetelně viditelného květenství, do plné zralosti bobulí ² na počátku líhnutí housenek 2. a 3. generace ⁴ do počátku skanutí max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Zelenina plodová	housenky motýlí	7,5 g/100 m ² (5–10 l vody/100 m ²)	AT	¹ od vyvinutí 2. pravého listu do plné zralosti plodů ² na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stadia larvy ³ skleniky max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Zelenina košťálová	housenky motýlí	5 g/100 m ² (4–8 l vody/100 m ²)	AT	¹ od vyvinutí 2. pravého listu do plné zralosti plodů ² na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stadia larvy ³ pole max. 6x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Okrasné rostliny do 50 cm	housenky motýlí	0,06 % (6 g/10 l vody)	1	¹ od vyvinutí 2. pravého listu do plné zralosti ² na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stadia larvy ⁴ do počátku skanutí ³ skleniky max. 6x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ⁴k dávkování, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

inzerce

Kvalitní genetika ...

(Dokončení ze str. 25)

Vynikající vyrovnanost středně vysokých až vysokých rostlin a palic v porostu je každoroční zárukou produkce vysoce kvalitní siláže s velmi vysokým podílem zrna. To vše doplněno o velmi silný stay green (9,0). V suchých ročních Korynt exceluje výnosovou stabilitou a udržením sklizňového okna.

Neutrino S240/Z240 je hybridem, který o svých kvalitách silážní kukuřice přesvědčuje také v Německu. Neutrino je především výnos. V rámci registračního řízení BSA dosáhlo nejvyššího hodnocení ve výnosu hmoty a absolutní výnosovou špičku potvrzuje také v ČR. Navzdory velmi vzrůstným rostlinám s bohatým olíštěním není siláž z Neutrino nízké kvality. Obsahy škrobu v siláži jsou řaděny zelenou hmotou na střední úroveň, stravitelnost organické hmoty siláže je středně vysoká. Neutrino je špičkovým silážním hybridem, ideálním z hlediska TOP výnosů hmoty a její kvality pro krmné



Neutrino umí výnos a škrob

Foto archiv firmy

Merkur (pendimethalin 333 g/l, flufenacet 80 g/l, diflufenikan 20 g/l), Adama CZ s. r. o., Dolní Břežany, platnost do 31. 10. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimý ječmen, ozimé žito, ozimá pšenice, ozimé tritikale	plevele dvouděložné, jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní	3 l/ha, 300–400 l vody/ha	AT	¹ preemergentně nebo postemergentně na podzim, BBCH 00–29; max. 1x
Ozimý ječmen, ozimé žito, ozimá pšenice, ozimé tritikale	plevele dvouděložné, jednoleté, chundelka metlice, lipnice roční	2,25 l/ha, 300–400 l vody/ha	AT	¹ preemergentně nebo postemergentně na podzim, BBCH 00–29; max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ozimý ječmen, ozimé žito, ozimá pšenice, ozimé tritikale	50	25	16	6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Ozimý ječmen, ozimé žito, ozimá pšenice, ozimé tritikale 5 0 0 0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se ($\geq 3^\circ$ svahovitost) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Silvion Xpro (bixafen 100 g/l, fluopyram 100 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 31. 1. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ječmen	rychosporiová skvrnitost ječmene, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná	1,25 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–59 max. 1x
Pšenice	braničnatka pšeničná, rez pšeničná	1,25 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–59 max. 1x
Žito	rez žitná, rychosporiová skvrnitost ječmene	1,25 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–59 max. 1x
Tritikale	rez žitná, braničnatka pšeničná	1,25 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 30–59 max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Ječmen, pšenice, žito, tritikale	4	4	4	4

Zorvec ENTECTA (amisulbrom 240 g/l, oxathiapiprolin 48 g/l), Corteva Agriscience Czech s. r. o., Praha, platnost do 30. 9. 2025

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	plíseň bramboru	0,25 l/ha, 200–600 l vody/ha	7	¹ BBCH 21–89 max. 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: ¹k plodině, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Brambory	4	4	4	4

(Pokračování na str. 28)

účely a bioplynové stanice. Pokud máte jednu silážní jámu pro krmné účely i BPS, pak Neutrino je správnou volbou.

Sucorn S280/Z280 a Novialis S300/Z300 jsou dva bratři, přičemž Novialis je o něco novější a pozdnější verzi. Oba hybridy jsou kombinací velmi vzrůstných rostlin s bujným olíštěním a s mohutnou a silnou palicí. Sucorn DS1710C a Novialis DS1901C tak vytváří kompaktní až neprostupné porosty pro špičkové výnosy hmoty. BSA Německo hodnotí výnosy hmoty obou hybridů špičkovými známkami 8, resp. 9. Díky špičkovým výnosům zrna jsou siláže Sucorn DS1710C a Novialis DS1901C vysoké kvality. Z hlediska produkčního využití se jedná o univerzální hybridy pro produkci krmné siláže, bioplynu a také suchého či vlhkého zrna. Vynikajících výsledků oba hybridy dosahují při produkci vlhkého zrna. Navíc jsou Sucorn DS1710C a Novialis DS1901C vybaveny stay greenem pro dlouhé sklizňové okno v suchých ročních.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.
produktový manažer kukuřice
SAATEN-UNION CZ s. r. o.



Vlastislav Nosek, poradce v regionu severní Čechy: „Novialis je v mém suchém regionu zárukou stabilních výnosů kvalitní siláže“

Foto archiv firmy

Přehled nových ...

(Dokončení ze str. 26)

VITROL GB (difosforečnan železitý 24 g/kg), BROS spółka z ograniczona odpowiedzialnościa, Polsko, platnost do 3. 8. 2036

Profesionální použití:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Obilniny	slimáci	4–7 kg/ha	AT	¹ před vzejtím, po začátku vegetace ² při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení max. 6x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Olejníny	slimáci	4–7 kg/ha	AT	¹ před vzejtím, po začátku vegetace ² při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení max. 6x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ovoce bobulovité a drobné	slimáci, plzáci, hlemýžďovití	7 kg/ha	AT	² při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení ³ venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory max. 6x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Okrasné rostliny (aksamitník, funkcie aj.)	slimáci	12–25 kg/ha	AT	¹ před vzejtím, po začátku vegetace ² při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení ³ venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory max. 6x, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Neprofesionální použití:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ovoce bobulovité a drobné	slimáci, plzáci, hlemýžďovití	0,7 g/m ²	AT	¹ po začátku vegetace ² při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení ³ venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory max. 6x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Okrasné rostliny (aksamitník, funkcie aj.)	slimáci	1,2–2,5 g/m ²	AT	² při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení ³ venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory max. 6x, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Rozhodnutí nebyla vydána

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Amistar + další obchodní jméno Amis, COMMODOR, Azoguard AZT 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Conclude AZT 250 SC, Mirador (azoxystrobin 250 g/l), Syngenta Limited, Spojené Království, platnost do 31. 12. 2025

Rozsah povoleného použití:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ječmen	hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná	0,8 l/ha, 200–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–59; max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice	braničnatka plevová, rez pšeničná, rez plevová, braničnatka pšeničná	0,8 l/ha, 200–300 l vody/ha	35	¹ BBCH 30–59; max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů
Řepka olejka	hlízenka obecná, černá řepková	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	21	¹ BBCH 60–69 max. 1x
Brambor	kořenomorka bramborová, koletotrichové vadnutí brambor	3 l/ha, 50–150 l vody/ha	AT	¹ při výsadbě aplikace do půdy, max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, ječmen, řepka olejka, brambor	4	4	4	4

Rozsah rozšířeného použití podle čl. 51 nařízení: Menšinové použití přípravku povolené podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Lupina	antraknóza.	1 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	² preventivně nebo při zjištění výskytu max. 1x

Poznámka: ²ke škodlivému organismu, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Lupina	4	4	4	4

Chanon (aklonifen 600 g/l), GLOBACHEM nv., Belgie, platnost do 31. 7. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté	2 l/ha, 150–400 l vody/ha	AT	¹ preemergentně, BBCH 00–08 max. 1x
Sója	ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté	1,5–3 l/ha, 150–500 l vody/ha	AT	¹ preemergentně max. 1x
Slunečnice, hrách, fazol, bob, čočka, cizrna beraní	ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté	3 l/ha, 150–500 l vody/ha	AT	¹ preemergentně max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Brambor	20	10	5	4
Slunečnice	35	16	8	4
Sója, hrách, fazol, bob, čočka, cizrna beraní	40	18	9	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Brambor, slunečnice, sója, hrách, fazol, bob, čočka, cizrna beraní	5	0	0	0

Brambor: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Slunečnice, sója, hrách, fazol, bob, čočka, cizrna beraní: za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažitých se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

4. Rozšíření použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána

5. Rozšířené použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravky platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

Barclay Propyz (propyzamid 400 g/l), platnost do 30. 6. 2026

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Jetel inkarnát	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	1,75 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ na podzim (listopad) ² BBCH 10–12 ³ množitelské porosty max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²ke škodlivému organismu, ³k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Jetel inkarnát	12	6	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Jetel inkarnát	5	0	0	0

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažitých se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Enervin SC (ametoktradin 200 g/l), platnost do 31. 7. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pór	zasychání špiček listů póru	1,2 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	7	¹ BBCH 11–48; ² pole max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Cibule	plíseň cibulová	1,2 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	7	¹ BBCH 15–48; ² pole ³ na cibuli, na naf max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Česnek	plíseň cibulová	1,2 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	7	¹ BBCH 15–48; ² pole max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Salát hlávkový, čekanka, šterbák zahradní (endívie), rukola setá, kozlíček polníček	plíseň salátu	1,2 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	7	¹ BBCH 15–49; ² pole max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Okurka, cuketa, patizon, tykev	plíseň okurky	1,2 l/ha, 200–1 000 l vody/ha	3	¹ BBCH 51–89; ² pole max. 2x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Okrasné rostliny	plíseň	1,2 l/ha, 500–2 000 l vody/ha (postřik); 8 000–30 000 l vody/ha (závlivka)	1	³ od BBCH 21 ³ venkovní prostory, chráněné prostory ⁶ produkční plochy max. 2x za rok, interval mezi aplikacemi 7–10 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění, ³k určení sklizně, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Okrasné rostliny nad 150 cm	15	12	6	6

Okrasné rostliny nad 150 cm: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.

Medax Max (prohexadion 42,39 g/kg, trinepak-ethyl 75 g/kg), platnost do 30. 4. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ostropestřec mariánský	zvýšení odolnosti proti poléhání	0,75–1 kg/ha, 200–400 l vody/ha	AT	¹ BBCH 40–45 ² množitelské porosty max. 1x

Poznámka: ¹k plodině, ²k určení sklizně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Scala (pyrimethanil 400 g/l), platnost do 30. 4. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Cibule	botryotiniová skvrnitost listů cibule	2 l/ha, 300–600 l vody/ha	14	¹ BBCH 19–48 ² pole max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dnů
Pór	alternariová skvrnitost česnekovitých	2 l/ha, 300–600 l vody/ha	14	¹ BBCH 19–49 ² pole max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dnů
Mrkev	suchá skvrnitost listů mrkve	2 l/ha, 300–600 l vody/ha	21	¹ BBCH 41–49 ² pole max. 2x, interval mezi aplikacemi 10 dnů
Okurka, cuketa, patizon, tykev	plíseň šedá	1 l/ha do 50 cm, 1,5 l/ha 50–125 cm, 2 l/ha nad 125 cm, 600 l vody/ha do 50 cm, 900 l vody/ha 50–125 cm, 1 200 l vody/ha nad 125 cm	3	¹ BBCH 61–89 ² skleníky max. 3x, interval mezi aplikacemi 10 dnů

Poznámka: ¹k plodině, ²k umístění, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Cibule, pór, mrkev	4	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažitých se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

(Dokončení přehledu najdete v některém dalším čísle týdeníku Zemědělec.)

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová