

Přehled nových povolení přípravků

Následující tabulky uvádějí přehled nových registrací přípravků, přípravky s rozšířeným použitím nebo změnou v použití a přípravky pro minoritní použití za období 1. 11. až 30. 11. 2022. Informace jsou čerpány z údajů zveřejněných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, kde naleznete podrobnější informace.

1. Nové povolené přípravky na ochranu rostlin

Promina Xtra (azoxystrobin 140 g/l, prothioconazol 100 g/l), CAC Chemical GmbH, Německo, platnost do 31. 7. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, místelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice	braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, helmintosporiáza pšenice	1,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	44	"BBCH 30–59; max. 2x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů
Pšenice	fuzariózy klasů	1,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	44	"BBCH 59–69 "max. 1x
Ozimý ječmen	rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene	1,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	"BBCH 30–59; max. 2x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů
Jarní ječmen	hnědá skvrnitost ječmene	1,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	35	"BBCH 30–59; max. 2x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů
Žito	rez pšeničná, braničnatka plevová, rynchosporiová skvrnitost	1,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	44	"BBCH 30–59; max. 2x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů
Ozimé tritikale	braničnatka plevová, rez pšeničná, helmintosporiáza obilnin	1,4 l/ha, 200–400 l vody/ha	44	"BBCH 30–59; max. 2x, interval mezi aplikacemi 14–21 dnů
Řepka olejka	hlízenka obecná, alternariová skvrnitost	1,2 l/ha, 200–400 l vody/ha	56	"BBCH 59–69 max. 1x

Poznámka: "k plodně, "k dávkování, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
pšenice jarní a ozimá, ječmen jarní a ozimý, tritikale ozimé, žito jarní a ozimé, řepka olejka jarní a ozimá	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)				
pšenice jarní a ozimá, ječmen jarní a ozimý, tritikale ozimé, žito jarní a ozimé	5	0	0	0

Ozimé obilniny (ozimá pšenice, ozimý ječmen, ozimé tritikale, ozimé žito): za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám (svažitost $\geq 3^\circ$). Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

2. Nové povolené pomocné prostředky na ochranu rostlin

Rozhodnutí nebyla vydána.

3. Rozšíření použití nebo změna v použití přípravku

Benevia (cyantraniliprol 100 g/l), FMC Agro Česká republika spol. s r. o., Praha 7, platnost do 14. 9. 2027

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, místelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Brambor	mandelinka bramborová	0,125 l/ha, 300–600 l vody/ha	14	"BBCH 12–70; "pole max. 1x
Cibule, cibule šalotka, česnek	třásněnka zahradní, květlika cibulová	0,75 l/ha, 200–800 l vody/ha	1	"BBCH 12–80; "pole max. 1x
Jahodník	blýskavka červicová, květopas jahodníkový	0,75 l/ha, 300–1 000 l vody/ha	1	"BBCH 12–89; "pole max. 1x/rok
Mrkev, petržel kořenová, pastinák, celer, ředkev, tuřín	pochmurnatka mrkvová	0,75 l/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	"BBCH 11–89; "pole max. 1x
Mrkev, petržel kořenová, pastinák, celer, ředkev, tuřín	housešky	0,6 l/ha, 300–1 000 l vody/ha	14	"BBCH 11–89; "pole max. 1x
Květák, brokolice, zeli hlávkové, kapusta růžičková	housešky	0,4–0,5 l/ha, 300–800 l vody/ha	7	"BBCH 12–49; "pole max. 1x
Květák, brokolice, zeli hlávkové, kapusta růžičková	květlika zelná	0,75 l/ha, 300–800 l vody/ha	7	"BBCH 19–49; "pole max. 1x
Baklažán, rajče	makadlovka, vrtalky	0,6 l/ha, 40 ml/100 l vody, 300–1 500 l vody/ha	1	"BBCH 12–89; "skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Baklažán, rajče	černopáska bavlííková, blýskavka červicová, blýskavka bavlííková, kovolesklec jižní, molice bavlííková, molice skleníková, mšice bavlííková	1,125 l/ha, 60–75 ml/100 l vody, 300–1 500 l vody/ha	1	"BBCH 12–89; "skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Baklažán, rajče	třásněnka západní, třásněnka zahradní	1,2 l/ha, 75–100 ml/100 l vody, 300–1 500 l vody/ha	1	"BBCH 12–89; "skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Tykev, okurka, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní	vrtalky	0,6 l/ha, 40 ml/100 l vody, 300–1 500 l vody/ha	1	"BBCH 12–89; "skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Tykev, okurka, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní	černopáska bavlííková, blýskavka červicová, blýskavka bavlííková, kovolesklec jižní, molice bavlííková, molice skleníková, mšice bavlííková	1,125 l/ha, 60–75 ml/100 l vody, 300–1 500 l vody/ha	1	"BBCH 12–89; "skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Tykev, okurka, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní	třásněnka západní, třásněnka zahradní	1,2 l/ha, 75–100 ml/100 l vody, 300–1 500 l vody/ha	1	"BBCH 12–89; "skleníky max. 4x, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Jahodník	černopáska bavlííková, blýskavka červicová, blýskavka bavlííková	0,75 l/ha, 60–75 ml/100 l vody, 300–1 000 l vody/ha	1	"BBCH 12–89; "skleníky max. 2x/rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Jahodník	třásněnka západní, třásněnka zahradní, mšice broskvoňová, květopas jahodníkový, octomilka japonská	0,75 l/ha, 60–75 ml/100 l vody, 300–1 000 l vody/ha	1	"BBCH 12–89; "skleníky max. 2x/rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: "k plodně, "k umístění, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Brambor, cibule, cibule šalotka, česnek, jahodník, mrkev, petržel kořenová, pastinák, celer, ředkev, tuřín, květák, brokolice, zeli hlávkové, kapusta růžičková	4	4	4	4

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů (dokončení tabulky)

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)				
Brambor	5	5	0	0
Cibule, cibule šalotka, česnek, jahodník, mrkev, petržel kořenová, pastinák, celer, ředkev, tuřín, květák, brokolice, zeli hlávkové, kapusta růžičková	15	10	5	5

Mrkev, petržel kořenová, pastinák, celer, ředkev, tuřín: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Border (mesotrion 100 g/l), FMC Agro Česká republika spol. s r. o., Praha 7, platnost do 31. 5. 2033

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, místelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Kukuřice	plevele dvouděložné jednoleté, ježatka kuří noha	0,75–1 l/ha, 100–400 l vody/ha	AT	"BBCH 11–18 max. 1x

Poznámka: "k plodně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Kukuřice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)				
Kukuřice	30	15	10	5

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost $\geq 3^\circ$) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Grassrooter (ethefon 480 g/l), Sharda Cropchem Limited, Indie, platnost do 31. 7. 2023

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, místelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Ozimá pšenice, ozimý ječmen	regulace růstu	1 l/ha, 200 l vody/ha	AT	"BBCH 41–51; max. 1x
Jarní ječmen	regulace růstu	0,75 l/ha, 200 l vody/ha	AT	"BBCH 41–49; max. 1x
Jarní pšenice	regulace růstu	0,5–1 l/ha, 150–400 l vody/ha	AT	"BBCH 37–45; max. 1x
Ozimé tritikale	regulace růstu	0,5–1,25 l/ha, 150–400 l vody/ha	AT	"BBCH 37–45; max. 1x
Jabloň	redukce nadměrné násady květů	0,25–0,75 l/ha (0,05 %), 500–1 500 l vody/ha	10	"BBCH 57–61 max. 1x za rok
Jabloň	podpora vybarvení plodů, sjednocení dozrávání	0,25–0,75 l/ha (0,05 %), 500–1 500 l vody/ha	10	"BBCH 78–85 max. 1x za rok
Hrušeň	stimulace tvorby květních pupenů	0,05–0,3 l/ha (0,01–0,025 %), 500–1 200 l vody/ha	60	"BBCH 69–74; "do celkové dávky 0,6 l/ha za rok, max. 3x za rok, interval mezi aplikacemi 7 dnů

Poznámka: "k plodně, "k dávkování, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Stavento (folpet 500 g/l), Adama CZ s. r. o., Dolní Břežany, platnost do 31. 7. 2024

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, místelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Pšenice	braničnatka pšeničná	1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	42	"BBCH 30–59 max. 2x, interval mezi aplikacemi 7–14 dnů
Ječmen	hnědá skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene	1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha	AT	"BBCH 30–59 max. 2x, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: "k plodně, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	Bez redukce	Tryska 50 %	Tryska 75 %	Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)				
Pšenice, ječmen	4	4	4	4

4. Rozšíření použití nebo změna v použití pomocného prostředku

Rozhodnutí nebyla vydána.

5. Rozšíření použití povoleného přípravku nebo změna v rozšířeném použití přípravku tzv. minority (tj. menšinová použití)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (nařízení vydané pro referenční přípravky platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

AppleSmart 3.3 VP (1-methylcyklopropan 33 g/kg), platnost do 31. 7. 2035

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, místelnost	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
Hrušeň, kdouloň (plody ke skladování)	uchování kvality plodů	37–68 mg/m ³ chladírny	AT	"do 7 dnů od sklizně při teplotě pod 10 °C, do 3 dnů od sklizně při teplotě nad 10 °C "sklady
Slivoň, meruňka, broskvoň, aktinidie (plody ke skladování)	uchování kvality plodů	37–49 mg/m ³ chladírny	AT	"do 7 dnů od sklizně při teplotě pod 10 °C, do 3 dnů od sklizně při teplotě nad 10 °C "sklady; max. 1x
Rajče – červené odrůdy, paprika, baklažán (plody ke skladování)	uchování kvality plodů	37–49 mg/m ³ chladírny	AT	"do 24 hodin od sklizně; "sklady max. 1x
Zeli hlávkové, zeli pekingské, brokolice	uchování kvality hlávek/růžic	38–49 mg/m ³ chladírny	AT	"do 7 dnů od sklizně; "sklady max. 1x
Květliny	uchování kvality květů	24 mg/m ³ chladírny	AT	"ihned po sklizni; "sklady max. 3x, interval mezi aplikacemi 1 den
Tulipán, cibulovité okrasné rostliny	uchování kvality cibulí	16 mg/m ³ chladírny	AT	"ihned po sklizni; "sklady max. 10x, interval mezi aplikacemi 14 dnů

Poznámka: "k plodně, "k umístění, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní, OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

(Dokončení přehledu najdete v některém dalším čísle týdeníku Zemědělec.)

Přehled přípravků připravila Barbora Venclová