

Nové odrůdy cibulové zeleniny

Cibulová zelenina má v České republice nezastupitelné místo. I když s celkem 120 registrovanými odrůdami nemohou konkurovat odrůdově daleko bohatší plodové zelenině, co do ploch osevu si cibuloviny již řadu let drží v rámci zeleniny své prvenství.

V období od 1. ledna 2019 do 31. srpna 2024 bylo do Státní odrůdové knihy zapsáno 38 nových odrůd cibulovin, z toho 28 z českého šlechtění. Ráda bych vás s těmito novými českými odrůdami seznámila.

Cibule *Allium cepa* L. var. *cepa*

Ke 31. srpnu 2024 je ve Státní odrůdové knize zapsáno 42 odrůd cibule jarní a pět odrůd cibule ozimé. Nově bylo registrováno pět odrůd cibule jarní a dvě odrůdy cibule ozimé.

Aeneus

Aeneus je pozdní hybridní odrůda určená pro jarní výsevy semene.

Olistění vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené, slabě ojiněné. Cibule středně velká až velká, kruhovitěho tvaru, s tmavě hnědou barvou horních suchých středně až silně přiléhavých suknic. Obsah sušiny nízký až středně vysoký, doba rašení během skladování velmi pozdní. Udržovatelem je SEMO a. s.

Armina

Armina je středně pozdní až pozdní hybridní odrůda určená pro jarní výsevy semene.

Olistění vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené, sla-

bě až středně ojiněné. Cibule středně velká až velká, široce elipsovitého tvaru, se středně hnědou barvou horních suchých silně přiléhavých suknic. Obsah sušiny středně vysoký, doba rašení během skladování velmi pozdní. Udržovatelem je MORAVO-SEED CZ a. s.

Aurelie

Aurelie je pozdní odrůda určená pro jarní výsevy semene.

Olistění vzpřímené až polovzpřímené, středně až tmavě zelené, slabě až středně ojiněné. Cibule středně velká až velká, kruhovitěho tvaru, se středně hnědou barvou horních suchých středně až silně přiléhavých suknic. Obsah sušiny nízký až středně vysoký, doba rašení během skladování pozdní až velmi pozdní. Udržovatelem je MORAVO-SEED CZ a. s.

Kasa

Kasa je středně pozdní hybridní odrůda určená pro jarní výsevy semene.

Olistění polovzpřímené, středně až tmavě zelené, středně ojiněné. Cibule středně velká až velká, kruhovitěho tvaru, se středně hnědou barvou horních suchých středně až silně přiléhavých suknic. Obsah sušiny střed-



Cibule v odrůdovém pokusu

Foto archiv autorky

ně vysoký, doba rašení během skladování středně pozdní.

Udržovatelem je MORAVO-SEED CZ a. s.

Klaria

Klaria je pozdní odrůda určená pro jarní výsevy semene.

Olistění vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené, středně ojiněné. Cibule středně velká až velká, kruhovitěho tvaru, se středně až tmavě hnědou barvou horních suchých středně přiléhavých suknic. Obsah sušiny nízký až středně vysoký, doba

rašení během skladování velmi pozdní.

Udržovatelem je SEMO a. s.

Siesta

Siesta je středně pozdní odrůda určená pro podzimní výsevy semene.

Olistění vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené, slabě až středně ojiněné. Cibule středně velká, kruhovitěho tvaru, se středně až tmavě hnědou barvou horních suchých středně až silně přiléhavých suknic. Obsah sušiny nízký až středně vysoký, doba

rašení během skladování středně pozdní až pozdní.

Udržovatelem je MORAVO-SEED CZ a. s.

Winteria

Winteria je středně pozdní odrůda určená pro podzimní výsevy semene.

Olistění vzpřímené až polovzpřímené, středně až tmavě zelené, středně ojiněné. Cibule středně velká, kruhovitěho tvaru, se středně hnědou barvou horních suchých středně až silně přiléhavých suknic. Obsah sušiny středně vy-

soký, doba rašení během skladování středně pozdní až pozdní.

Udržovatelem je SEMO a. s.

Cibule sečka *Allium fistulosum* L.

Ke 31. srpnu 2024 je ve Státní odrůdové knize zapsáno 11 odrůd cibule sečky. Nově byla registrována jedna odrůda.

Snow Queen

Snow Queen je hybridní odrůda růstového typu s jedním nepravým stvolcem.

Rostlina středně vysoká. Počet listů na nepravém stvolu středně velký. Olistění středně zelené, vzpřímené, se silnou voskovou vrstvou. List středně dlouhý, s velmi slabým zahnutím špiček. Nepravý stvol středně dlouhý až dlouhý, bez antokyanového zbarvení, rozšíření do cibule není nebo velmi slabé. Udržovatelem je SEMO a. s.

Česnek *Allium sativum* L.

Ke 31. srpnu 2024 je ve Státní odrůdové knize zapsáno pět odrůd česneku jarního a 35 odrůd česneku ozimého. Nově byly registrovány čtyři odrůdy česneku jarního a 12 odrůd česneku ozimého.

(Pokračování na str. 33)

(Dokončení ze str. 32)

Adam
Adam je středně pozdní odrůda typu jarního nepalíčáku. Olistění vzpřímené až polovzpřímené, barva listu světle zelená se středně silnou voskovou vrstvou. Cibule malá, na příčném řezu elipsovitého tvaru, bez

Beskydský palíčák
Beskydský palíčák je středně pozdní až pozdní odrůda typu ozimého palíčáku vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek. Olistění vzpřímené až polovzpřímené, barva listu středně až tmavě zelená se středně sil-

ličáku vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek. Olistění vzpřímené až polovzpřímené, barva listu středně zelená se středně silnou až silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek středně velký až

palíčáku vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek. Olistění vzpřímené, barva listu světle zelená se slabou až středně silnou voskovou vrstvou. Cibule velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek středně velký, základní barva suknice hnědá s an-

vitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek středně velký až velký, základní barva suknice krémová s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy střední. Konec dormance stroužku v cibuli pozdní. Udržovatelem je TAGRO Červený Dvůr, spol. s r. o.

středně široké, barva středně žlutozelená bez antokyanového zbarvení, se středně silnou až silnou voskovou vrstvou. Lodyha středně dlouhá až dlouhá, středního průměru, rozšíření do cibule slabé, zúžení k bázi není.

Moravín
Moravín je hybridní odrůda vhodná pro letní a podzimní sklizeň. Rostlina středně vysoká, postavení listů polovzpřímené, listy dlouhé, středně široké, barva středně zelená bez antokyanového zbarvení, se silnou voskovou vrstvou. Lodyha středně dlouhá, středního průměru, rozšíření do cibule slabé až střední, zúžení k bázi není.

Odrín
Odrín je hybridní odrůda vhodná pro podzimní a zimní sklizeň. Rostlina středně vysoká, postavení listů polovzpřímené až horizontální, listy středně dlouhé až dlouhé, středně široké, barva středně šedo zelená bez antokyanového zbarvení, se středně silnou voskovou vrstvou. Lodyha krátká, středního průměru, rozšíření do cibule slabé, zúžení k bázi není.

Šalotka
Allium cepa L. var. *aggregatum* G. Don

Ke 31. srpnu 2024 je ve Státní odrůdové knize zapsána jedna odrůda šalotky, registrovaná v roce 2019.

Schelia
Schelia je pozdní odrůda určená pro jarní výsevy semene. Olistění vzpřímené až polovzpřímené, středně až tmavě zelené, silně ojiněné. Tendence k rozpadání na cibulky střední, stupeň rozpadu na cibulky slabý. Cibule středně velká, široce vejčitého tvaru, se středně až tmavě růžovou barvou horních suchých silně přiléhavých sukní. Obsah sušiny středně vysoký až vysoký, doba rašení během skladování středně pozdní. Udržovatelem je MORAVO-SEED CZ a. s.

Ing. Lenka Lefnerová
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský



Česnek v odrůdovém pokusu



Foto archiv autorky

bočních stroužků. Stroužek malý až středně velký, základní barva suknice růžová s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy slabá až střední. Konec dormance stroužku v cibuli velmi pozdní. Udržovatelem je Ing. Jitka Hrubešová.

Hněvotínský jarní
Hněvotínský jarní je středně pozdní odrůda typu jarního palíčáku vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek. Olistění polovzpřímené, barva listu středně zelená se slabou až středně silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek středně velký až velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy slabá až střední. Konec dormance stroužku v cibuli pozdní až velmi pozdní. Udržovatelem je Marek Kvapil.

Manin jarní z Dolněmčí
Manin jarní z Dolněmčí je středně pozdní odrůda typu jarního nepalíčáku vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek. Olistění vzpřímené až polovzpřímené, barva listu světle až středně zelená se středně silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká, na příčném řezu elipsovitého tvaru, s bočními stroužky. Stroužek malý až středně velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy slabá. Konec dormance stroužku v cibuli velmi pozdní. Udržovatelem je Marek Kvapil.

Matinka
Matinka je raná až středně pozdní odrůda typu jarního nepalíčáku. Olistění vzpřímené, barva listu středně až tmavě zelená se silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká až velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, s bočními stroužky. Stroužek středně velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy slabá až střední. Konec dormance stroužku v cibuli velmi pozdní. Udržovatelem je Ing. Václav Kozák.

nou voskovou vrstvou. Cibule středně velká až velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek středně velký až velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy střední až silná. Konec dormance stroužku v cibuli velmi pozdní. Udržovatelem je Václav Martyněk.

Hanácký palíčák
Hanácký palíčák je středně pozdní až pozdní odrůda typu ozimého palíčáku. Olistění vzpřímené, barva listu středně až tmavě zelená se středně silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká až velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy střední. Konec dormance stroužku v cibuli střední. Udržovatelem je Marek Kvapil.

Janko
Janko je pozdní odrůda typu ozimého palíčáku. Olistění vzpřímené, barva listu středně zelená se středně silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy střední až silná. Konec dormance stroužku v cibuli pozdní až velmi pozdní. Udržovatelem je Ing. Václav Kozák.

Křimický
Křimický je raná až středně pozdní odrůda typu ozimého pa-

velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy slabá až střední. Konec dormance stroužku v cibuli střední až pozdní. Udržovatelem je Mgr. Martin Moravec.

Oldřich
Oldřich je raná až středně pozdní odrůda typu ozimého palíčáku vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek. Olistění vzpřímené, barva listu středně zelená se středně silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek středně velký až velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy střední. Konec dormance stroužku v cibuli střední. Udržovatelem je Bc. Jakub Heža.

Otakar
Otakar je středně pozdní odrůda typu ozimého palíčáku. Olistění vzpřímené, barva listu středně až tmavě zelená se slabou až středně silnou voskovou vrstvou. Antokyanové zbarvení na bázi nepravého stvolu slabé, květní stvol dlouhý. Cibule velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek středně velký až velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy střední až silná. Konec dormance stroužku v cibuli střední. Udržovatelem je Ing. Jitka Hrubešová.

Rovenský
Rovenský je raná až středně pozdní odrůda typu ozimého ne-

tokyanovými pruhy, intenzita základní barvy slabá. Konec dormance stroužku v cibuli pozdní. Udržovatelem je Marek Kvapil.

Rusinka
Rusinka je středně pozdní odrůda typu ozimého palíčáku. Olistění vzpřímené, barva listu středně zelená se středně silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká až velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy slabá. Konec dormance stroužku v cibuli středně pozdní. Udržovatelem je Ing. Václav Kozák.

Severský palíčák
Severský palíčák je středně pozdní odrůda typu ozimého palíčáku vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek. Olistění vzpřímené až polovzpřímené, barva listu světle zelená se slabou voskovou vrstvou. Cibule malá, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek malý, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy střední. Konec dormance stroužku v cibuli pozdní až velmi pozdní. Udržovatelem je Marek Kvapil.

Skalka
Skalka je středně pozdní až pozdní odrůda typu ozimého palíčáku. Olistění vzpřímené, barva listu tmavě zelená se silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká, na příčném řezu kruhovitého tvaru, bez bočních stroužků. Stroužek středně velký, základní barva suknice hnědá s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy slabá až střední. Konec dormance stroužku v cibuli pozdní až velmi pozdní. Udržovatelem je Ing. Václav Kozák.

Tarly
Tarly je raná až středně pozdní odrůda typu ozimého nepalíčáku. Olistění vzpřímené až polovzpřímené, barva listu středně zelená se středně silnou voskovou vrstvou. Cibule středně velká až velká, na příčném řezu kruho-



Pažitka v odrůdovém pokusu

Foto archiv autorky